

# BALAYA Flex Pack

BALAYA® + FLEXITY® fungicidai



## FUNGICIDAI



### Veikliosios medžiagos:

BALAYA: mefentriflukonazolas 100 g/l  
piraklostrobinas 100 g/l  
FLEXITY: metrafenonas 300 g/l



### Produkto forma

koncentruota emulsija (EC) ir  
koncentruota suspensija (SC)



### Pakuotė

2 x 5 l BALAYA + 5 l FLEXITY  
(15–20 ha plotui nupurkšti)



### Pasiklausykite!

Nuskenuokite QR kodą ir  
klausykitės produkto pristatymą.



### Pasiklausykite!

Nuotaikinga BALAYA FLEX  
PACK daina jūsų telefono  
skambučiui (*Android*).  
Parsisiųsti dainą galite  
nuskenuavę QR kodą.



BALAYA FLEX PACK pakuotė sudaryta iš dviejų fungicidų: BALAYA ir FLEXITY. Abu fungicidai naudojami mišinyje. Šis mišinys pasižymi apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo lapų ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose.

BALAYA FLEX PACK pakuotė skirta 15-20 ha plotui nupurkšti.

Trijų veikliųjų medžiagų mišinys užtikrina itin platų veikimo spektrą.

## VEIKIMO BŪDAS

BALAYA FLEX PACK yra sudarytas iš 3 veikliųjų medžiagų: mefentriflukonazolo (REVYSOL), piraklostrobino ir metrafenono. Šis mišinys užtikrina labai platų veikimo spektrą prieš svarbiausias javų ligas, tokias kaip lapų septoriozė, varpų ir lapų septoriozė, miltligė, stiebalūžė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys. Tai puikus pasirinkimas pirmajam purškimui nuo ligų.

Į BALAYA FLEX PACK sudėtį įeina nauja veiklioji medžiaga REVYSOL.

**REVYSOL (Mefentriflukonazolas)** yra nauja veiklioji medžiaga, kuri priklauso triazolų grupės fungicidams. Veiklioji medžiaga, patekusi ant javų lapų paviršiaus, labai greitai absorbuojama ir lėtai vandens indais pernešama į viršutines augalo dalis. Šis lėtas sisteminis judėjimas leidžia susidaryti vidiniams veikliosios medžiagos rezervuarams, iš kurių ji pasiskirsto ir užtikrina ilgalaikį veikimą.

REVYSOL yra labai efektyvus nuo lapų septoriozės. Jis taip pat yra veiksmingas nuo kitiems triazolams atsparių lapų septoriozės rasių ir apsaugo nuo atsparumo išsivystymo. REVYSOL taip pat gerai veikia esant žemoms oro temperatūroms (nuo +5 °C) ir sumažintomis vandens normomis.

Po greito įsisavinimo REVYSOL pasklinda po augalą palaipsniui, taip pasiskirstydamas iki pat lapų galiukų ir apsaugodamas netgi tas dalis, kurios nebuvo pasiektos purškiant. REVYSOL atsargos kaupiasi vidiniuose lapų sluoksniuose, ir tai lemia ilgalaikę apsaugą.

**Piraklostrobinas** priklauso strobilurinių grupės fungicidams. Jis turi ir fiziologinį poveikį, kuris vadinamas žalinimo efektu. Nupurkšti augalai ilgiau išlieka žali, geriau įsisavina azotą, kaupia anglies dvideginį, pagamina daugiau maisto medžiagų, padidėja atsparumas nepalankioms oro sąlygoms (kaitrai, sausrai), lėtėja augalų senėjimo procesas, todėl padidėja derlius ir pagerėja grūdų kokybė.

**Metrafenonas** yra efektyvus nuo stiebalūžės ir miltligės. Metrafenonas, patekęs ant grybienos, neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti sporoms. Geriausiai metrafenonas veikia profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

## AUGALAI IR LIGOS

BALAYA FLEX PACK pasižymi labai geru veikimu nuo daugelio javų ligų:

Augalai	Ligos	Norma, l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų ir lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė, stiebalūžė.	Pakuotė 15-20 ha plotui	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69). Prieš stiebalūžę purškiama bamlėjimo pradžioje – iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32).
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramularija, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, miltligė.	Pakuotė 15-20 ha plotui	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).

Purškiama 1 kartą per sezoną.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

## MAIŠYMAS

BALAYA FLEX PACK galima maišyti su herbicidais ARRAT ir BIATHLON 4D, augimo reguliatoriais MEDAX TOP, MEDAX MAX, TERPAL (TERPAL į mišinius pilamas paskutinis), įvairiais fungicidais, taip pat su kokybiškomis mikroelementinėmis trąšomis.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 100–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 0,5–1,0 val.