

# Efilor<sup>®</sup>

Sisteminis triazolų ir karboksamidų grupės fungicidas žeminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų.

**AgCelence**  
Tikėkitės daugiau



## FUNGICIDAS



### Veikliosios medžiagos:

boskalidas 133 g/l  
metkonazolas 60 g/l



### Produkto forma

koncentruota suspensija (SC)



### Pakuotė

5 l



## VEIKIMO BŪDAS

EFILOR sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų – boskalido ir metkonazolo.

**Boskalidas** yra sisteminio ir translaminarinio veikimo, todėl patekęs į augalo lapus juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir nenupurkštos augalo dalys. Veiklioji medžiaga rapsuose naudojama apsaugai nuo labiausiai plintančių ligų: baltojo puvinio, fomozės ir juodosios dėmėtligės.

**Metkonazolas** yra plataus veikimo veiklioji medžiaga, turinti apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo tokių ligų rapsuose, kaip: juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė, fomozė ir pilkasis kekerinis puvinys. Metkonazolas yra sisteminio veikimo ir pasižymi akropetaliumi (iš apačios į viršų) judėjimu.

### Naudojimo apribojimai!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

## AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma, l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys*, pilkasis kekerinis puvinys.  Juodoji dėmėtligė.	0,7–1,0	Žydėjimo metu, pradėjus kristi pirmiems žiedlapiams (BBCH 63–65).  Žydėjimo pabaigoje arba ligai pradėjus plisti ant ankštarių (BBCH 69–75).

\* Purškiant nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, bus dalinai apsaugota ir nuo pilkojo kekerinio puvinio.

## MAIŠYMAS

EFILOR galima maišyti su insekticidu, taip pat su fungicidais JUVENTUS 90, CANTUS GOLD, PICTOR ACTIVE, REVDAS augimo reguliatoriumi CARYX ir skystomis trąšomis *Nutribor*. Darant mišinius, maišyklė turi visą laiką dirbti. Jei mišiniai putoja, naudokite produktus putojimui sumažinti.

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį EFILOR ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Neruoškite daugiau mišinio, nei planuojate sunaudoti.

## VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l/ha. Vandens kiekį rinkitės atsižvelgdami į augalų tankumą ir aukštį. Augalų lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu. Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose – 300–400 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose ir vasariniuose rapsuose – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.