

Ironmax^{®4} Pro

Skirtas profesionaliajam naudojimui



MOLIUSKOCIDAS



Veiklioji medžiaga

geležies ortofosfatas 24,2 g/kg
(2,42 % w/w)



Produkto forma

granulės (GR)



Pakuotė

20 kg

IRONMAX^{®4} PRO – moliuskocidas, skirtas apsaugoti javus, pupas, žirnius, šparagines pupeles, rapsus, linus, garstyčias, saulėgražas, sojas, kanapes, kukurūzus, moliūgus, žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus, brokolius, svogūnus, česnakus, salierus, porus, salotas, špinatus, morkas, ridikėlius, raudonuosius burokėlius, griežčius, ropes, cukrinius ir pašarinius runkelius, pievas nuo šliužų. Taip pat apsaugoti pomidorus, paprikas, baklažanus, prieskoninius augalus, agurkus, cukinijas, salotas, špinatus, arbūzus, melionus, auginamus šiltnamiuose nuo šliužų.

VEIKIMO BŪDAS

IRONMAX^{®4} PRO sutrikdo kalcio metabolizmą ir tokiu būdu blokuoja virškinimo procesą. Šliužai įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta. Dėl geležies fosfato veikimo pobūdžio, masalo suvartoję šliužai žūsta po žeme, todėl negyvų šliužų beveik nesimato. Poveikis gali būti matomas ne iš karto.

IRONMAX^{®4} PRO PRIVALUMAI

- Geras išsibarstymas – vienodo dydžio granules galima išbarstyti iki 24 m;
- Patrauklumas – patrauklus masalas, pagamintas iš rapsų;
- Skonis – produkto formuliacija suteikia gerą skonį, sustiprina veikimą ir šliužus paverčia negyvybingais;
- Granulės dirvoje išlieka ilgai veiksmingos;
- Greitas ir patikimas veikimas;
- Nekenksmingas sliekams.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimo norma: 5–7 kg/ha. 5 kg norma naudojama, kai yra mažas išplitimas arba 4–5 šliužai m², 6 kg norma naudojama, kai yra vidutinis išplitimas arba 6–23 šliužai m², 7 kg norma naudojama, kai yra didelis išplitimas arba 24 ir daugiau šliužų m².

Didžiausias naudojimų skaičius: 4.

Lauke auginami augalai	Augimo tarpniai
Javai: kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Pupos, žirniai, šparaginės pupelės – žalios ir auginamos sėklai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Prieskoniniai augalai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Rapsai, linai, kanapės, saulėgrąžos, sojos, garstyčios	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Kukurūzai, saldieji kukurūzai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Moliūgai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Ropiniai svogūnai, laiškiniai svogūnai, česnakai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Salierai, porai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Salotos, špinatai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Morkos, gumbiniai salierai, ridikėliai, raudonieji burokėliai, griežčiai, ropės	nuo BBCH 00 iki BBCH 14
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai	nuo BBCH 00 iki BBCH 14
Pievos	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo

Šiltnamiuose auginami augalai	Augimo tarpsniai
Pomidorai, saldžiosios ir aitriosios paprikos, baklažanai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Prieskoniniai augalai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Agurkai, cukinijos	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Salotos, špinatai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Arbūzai, melionai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo

APDOROJIMO BŪDAS

IRONMAX^{®4} PRO galima išbarstyti mechaniniu barstytuvu arba rankiniu būdu. Išbarstyti rankiniu būdu reikėtų tuomet, kai apdorojami nedideli plotai, pvz., augalai, auginami šiltnamiuose.

Barstydami saugokite, kad granulės nepatektų ant augalų lapų ir žiedynų. Didesnes nei 25 kg pakuotes išbarstykite mechaniniais barstytuvais.

PASTABA

Cukriniams runkeliams, pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms, morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams IRONMAX^{®4} PRO naudokite ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose, naudojant vėlesniuose augimo tarpsniuose, augalų apsaugos produktas gali būti neveiksmingas.