

# Arrat®

## Švarūs javu pasēliam

- Platus veikimo spektras
- Patikimas ir lankstus  
panaudojimas
- Ekonomiskas sprendimas  
zieminiams bei  
vasariniams javams
- Vienas herbicidas javams  
ir kukurūzams



Patikimas herbicidas  
javu ir kukurūzu  
pasēliams

 **BASF**  
We create chemistry

# Arrat®

## PATIKIMAS SULFONILURĖJOS GRUPĖS HERBICIDAS JAVAMS IR KUKURŪZAMS

**Veikliosios medžiagos:** 25% tritosulfurono + 50% dikambos

**Preparato forma:** vandenyje disperguojančios granulės

Tritosulfuronas ir dikamba suteikia produktui du skirtingus veikimo būdus. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, greitą ir patikimą veikimą nuo piktžolių. Arrat® patenka į piktžolę per lapus, taip pat gali būti pasisavinamas ir per augalo šaknis, tačiau dirvinis poveikis naujai išdygusioms piktžolėms yra nepakankamas. Jautriausios herbicidui yra aktyviai augančios piktžolės nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Šiltu (+10-18°C) ir drėgnu oru veiksmingumas yra geresnis. Jautrios herbicidui piktžolės žūva po dviejų – keturių savaičių. Arrat® gerai naikina tik dviskiltes piktžoles.

**Labai veiksmingas (95–100%) nuo:** kibiųjų lipikų, baltųjų bandų, bekvapių šunramunių, daržinių žliūgių, dėmėtųjų rūgčių, dirvinių aklių, dirvinių čižučių, dirvinių neužmirštuolių, dirvinių pienių, dirvinių ridikų, svėrių, garstukų, paprastųjų gaičių, paprastųjų žilių, rapsų pabirų, trikerčių žvaginių, vaistinių ramunėlių, vijoklinių pelėvirvėčių.

**Veiksmingas (>85%) nuo:** apskritalapių snapučių, dirvinių usnių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių, rugiagėlių, pūdyminių aguonų, raudonžiedžių notrelių, takažolių, vaistinių žvirblia-rūčių.

**Mažiau veiksmingas (<70%) nuo:** dirvinių našlaičių, dirvinių bobramunių.

### NORMOS

**Žieminiuose kviečiuose, kvietručiuose, rugiuose – 0,2 kg/ha**

Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 2–4 lapus nuo krūmijimosi vidurio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 25–29).

**Vasariniuose kviečiuose, miežiuose – 0,15 kg/ha**

Purkšti pavasarį, kai javai turi 3 lapelius iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13–25).

**Kukurūzuose – 0,2 kg/ha**

Purkšti, kai kukurūzai turi 3–6 lapelius. Nepurkšti aukštesnių, nei 25 cm kukurūzų.

Arrat®+PAM galima maišyti su dirviniu herbicidu Stomp® CS.

Naudodami herbicidą Arrat® pridėkite paviršiaus aktyviąją medžiagą (PAM). Taip pagerinsite veikliųjų medžiagų įsisavinimą ir užtikrinsite optimalų veikimą bet kokiomis oro sąlygomis.

\* PAM – paviršiaus aktyvios medžiagos (Trend, AD Kontaktas, Dash ir kt.)

### MAIŠYMAS

Purškiant javus, Arrat® galima maišyti kartu su anksti naudojamais fungicidais Allegro® Super, Bell® Super, Capalo®, Duett® Ultra, Corbel®, Flexity®, Tango® Super, Tango® Flex, augimo reguliatoriais Cycocel® 750, Medax® Top.

Jei pasėlyje yra smilguolių, rekomenduojame naudoti 0,15 kg/ha Arrat® + 0,015 kg/ha Monitor®<sup>1)</sup> mišinį. Maišydami su mikroelementinėmis trąšomis pasitarkite su gamintojais.


1) registruotas Monsanto Crop Sciences prekės ženklas

**Žieminiai javai**  
BBCH 13–29

0,2 kg Arrat® + PAM

**Vasariniai javai**  
BBCH 13–25

0,15 kg Arrat® + PAM



**Gamintojo atstovas:**

**BASF UAB**

Sausio 13-osios g. 4A,  
LT-04343 Vilnius  
Tel. 8 5 21 07 450,  
faks. 8 5 21 07 455

Roma Laurinkienė 8 687 56707

Aušra Slizinienė 8 652 30001

Saulius Nainys 8 699 40268

Aleksandr Voitkevič 8 685 27273

Paulius Paulauskis 8 618 86104

Tomas Karkazas 8 655 04162

Vilius Venskutonis 8 612 87 828

[www.agro.basf.lt](http://www.agro.basf.lt)

**PRIŠ NAUDODAMI PREPARATĄ VISADA SKAITYKITE ETIKETĘ!**