

Bell[®] Super

– užtikrintas derlius!



 **BASF**
We create chemistry

Užtikrintas derlius!

Bell[®] Super



Lapų septoriozė
(*Septoria tritici*)



Lapų ir varpų
septoriozė
(*Phaeosphaeria
nodorum*)



Kviečių dryžligė
(*Pyrenophora
tritici-repentis*)

Naujas aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos fungicidas nuo pagrindinių javų ligų, pasižymintis gydomuoju ir apsauginiu veikimu. Dvi veikliosios medžiagos bei pažangi produkto forma užtikrina labai gerą apsaugą nuo pagrindinių javų ligų.

Epoksikonazolas yra triazolų grupės veiklioji medžiaga, turinti labai stiprų gydomąjį veikimą. Jis labai veiksmingas nuo septoriozių, dryžligių, rūdžių, dalinai nuo stiebalūžės.


Boskalidas, karboksamidų grupės, sisteminio ir translinarinio veikimo veiklioji medžiaga yra labai veiksmingas nuo stiebalūžės. Jis taip pat sustiprina epoksikonazolo veikimą nuo septoriozių, dryžligių, ramularijos bei sumažina fiziologinių dėmių atsiradimą miežiuose.

Bell[®] Super tai:

- dvi veikliosios medžiagos su skirtingu veikimo būdu
- pilnoje normoje yra ne vienas, o 2 fungicidai!
- 25 % didesnis epoksikonazolo kiekis, lyginant su Bell – geresnis gydomasis veikimas
- boskalidas sustiprina epoksikonazolo poveikį nuo septoriozių, stiebalūžės, dryžligių, ramularijos, fiziologinių dėmių
- boskalidas sustiprina šiaudą
- pirmasis fungicidas rinkoje su nauja OD produkto forma

Bell[®] Super OD produkto forma tai:

- labai geras lapų padengimas
- vienalytis pasiskirstymas
- labai geras atsparumas lietai
- geresnė apsauga nuo naujos infekcijos
- labai geras įsisavinimas
- dar stipresnis gydomasis veikimas




Tirpiklio „surištas“
boskalidas

+



Dispersijoje ištirpęs
epoksikonazolas

=



OD produkto
forma

■ Boskalidas

■ Tirpiklis

■ Ištirpęs epoksikonazolas

Bell[®] Super sutvirtina šiaudus

Bell[®] Super sudėtyje esantis boskalidas ne tik apsaugo nuo ligų, bet ir sustiprina miežių šiaudus. Tokiu būdu jis apsaugo dalinai nuo išgulimo bei šiaudų lūžinėjimo. Boskalidas naikina saprofitinius grybus, kurie silpnina šiaudą ir bamblius. Jis taip pat skatina lignino gamybą, kuris yra lyg „cementas“, surišantis organinius statybinius blokus.


1 – protiokonazolas

2 – **Bell**

3 – protiokonazolas +
fluoksastrobinas

Šaltinis: Teagasc, Kildalton (Airija) 2005 m.





Rudosis rūdys
(*Puccinia recondita*)

Stiebalūžė
(*Oculimacula* spp.)

Tinkliškoji dryžligė
(*Pyrenophora teres*)



Rinchosporiozė
(*Rhynchosporium secalis*)

Ramularija
(*Ramularia collo-cygni*)

Fiziologinės dėmės

Tyrimų rezultatai

Lietuvoje, Latvijoje ir Danijoje vykdytų tyrimų metu tirta **Bell® Super** įtaka derliaus priedui. Jis buvo didesnis lyginant su standartiniu Bell.




Naudojimo rekomendacijos kviečiuose

Norma: 1,25-2,5 l/ha

Purkšti nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69).

Jei pasėliai sezono metu purškiami kelis kartus, geriausiai purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.



Bell® Super veikimas nuo ligų:

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai

Lapų septoriozė	••••
Lapų ir varpų septoriozė	••••
Kviečių dryžligė	•• (•)
Geltonosios rūdys	••••
Rudosis rūdys	••••
Stiebalūžė*	••••
Miltligė	• (•)

Miežiai

Dryžligės	••••
Rinchosporiozė	•••• (•)
Smulkiosios rūdys	••••
Ramularija	•••
Fiziologinės dėmės	••
Miltligė	••


* Nuo stiebalūžės purškiama bambėjimo pradžioje (BBCH 30-32).

•••• – ypatingai geras veikimas •• – geras veikimas
••• – labai geras veikimas • (•) – dalinis veikimas

Naudojimo rekomendacijos miežiuose

Norma: 1,25-2,5 l/ha

Rekomenduojama naudoti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bambėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31-59).



Bell[®] Super – užtikrintas derlius!

Bell Super • Registracijos Nr. 0419F/12

Veikliosios medžiagos:	50 g/l epoksikonazolo 140 g/l boskalido
Produkto forma:	aliejinė koncentruota suspensija
Veikimo būdas:	apsauginis ir gydomasis
Registruotas	žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose ir miežiuose
Rekomenduojama norma:	1,25-2,5 l/ha
Purškimų skaičius	ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną
Laikotarpis be lietaus	1 valanda
Paskutinis purškimas	35 dienos iki derliaus nuėmimo

Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite etiketę



Gamintojo atstovas:

BASF UAB

Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius
Tel. 8 5 21 07 450, faks. 8 5 21 07 455

Roma Laurinkienė 8 687 56707

Aušra Slizinienė 8 652 30001

Saulius Nainys 8 699 40268

Aleksandr Voitkevič 8 685 27273

Paulius Paulauskis 8 618 86104

Tomas Karkazas 8 655 04162

Vilius Venskutonis 8 612 87 828

www.agro.basf.lt

Platintojas:

UAB "Baltic Agro"

Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius

Tel. 8 5 270 11 87

Faksas 8 5 270 17 11

 **BASF**

We create chemistry