



Acrobat® Plus



Fungicidas

Sisteminio ir kontaktinio veikimo fungicidas, naudojamas bulvių apsaugai nuo bulvių maro ir sausligės, svogūnų apsaugai nuo netikrosios miltligės.

Veikliosios medžiagos:	dimetomorfos 90 g/kg mankocebas 600 g/kg
Produkto forma:	vandenyje dispersiškos granulės
Pakuotė:	1 kg, 5 kg

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Acrobat Plus yra dviejų veikliųjų medžiagų, dimetomorfo ir mankocebo, mišinys.

Dimetomorfos yra lokaliai sisteminis fungicidas, kuris pasižymi apsauginiu, gydomuoju bei antisporiniu poveikiu nuo bulvių maro ir kitų ligų. Jis veikia daugelyje ligos išsivystymo stadijų. Į augalus dimetomorfos patenka per lapus ir stiebus ir pasiskirsto visame lapų paviršiuje nuo viršutinės iki apatinės dalies. Veiklioji medžiaga veikia ant augalo paviršiaus ir augalo viduje, sunaikindama ligų sukėlėjus pradinėje infekcijos stadijoje. Dimetomorfos taip pat užtikrina gerą apsaugą nepalankiomis oro sąlygomis. Jis taip pat veiksmingas nuo metalaksilui atsparių grybo rasių.

Mankocebas yra kontaktinis fungicidas, kuris slopina zoosporų dygimą ir sustabdo maro, sausligės bei netikrosios miltligės vystymąsi.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma kg/ha	Naudojimas
Bulvės	Bulvių maras, sausligė	2,0	Pradedama purkšti, kai bulvės yra 15–30 cm aukščio ir iki augalai susiliečia eilutėse. Acrobat Plus purškiamas kas 10–14 dienų, priklausomai nuo ligos plitimo, bulvių veislės ir klimatinių sąlygų. Norint gerai apsaugoti bulves nuo maro, Acrobat Plus reikia purkšti profilaktiškai. Purškama kas 7–14 dienų, kai augalai aktyviai auga. Liga stipriai plinta esant šiltam ir drėgnam orui. Didžiausias purškimų skaičius – 8. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos.
Ropiniai svogūnai	Netikroji miltligė	2,0	Purškama pastebėjus pirmuosius ligos požymius, kas 7–14 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų. Netikslinga purkšti po to, kai svogūnų laiškai pradeda linkti (BBCH 46). Didžiausias purškimų skaičius – 3. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Acrobat Plus rekomenduojame naudoti mišinyje su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis (PAM), kurios pagerina fungicido veikimą.

MAIŠYMAS

Acrobat Plus gali būti maišomas su Fastac 50, Focus Ultra, Signum, Orvego. Insekticidas pilamas į purkštuvo talpą, kai Acrobat Plus visiškai ištirpsta.

Acrobat Plus gali būti maišomas su karbamide, magnio sulfatu bei mangano sulfatu.

Vandens kiekis – 150–1000 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 2 val.

