

Allegro[®] Super



Fungicidas

Sisteminis, strobilurinių grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių ir rugių laukuose nuo grybinių ligų.

Veiklosios medžiagos:	krezoksim-metilas 83 g/l epoksikonazolas 83 g/l fenpropimorfis 317 g/l
Produkto forma:	suspensija-emulsija
Pakuotė:	5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Į Allegro Super sudėtį įeina trys veiklosios medžiagos: krezoksim-metilas, epoksikonazolas ir fenpropimorfis. Trys veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.

Strobilurinių grupės veikloji medžiaga **krezoksim-metilas** turi paviršiaus sisteminį (pasiskirsto visame augalo lapų paviršiaus vaškiniame sluoksnyje) ir fiziologinį veikimą, kuris dar vadinamas žalinimo efektu. Augalai ilgiau išlieka žali, geriau įsisavina azotą, kaupia anglies dvideginį, pagamina daugiau maisto medžiagų, dėl ko padidėja atsparumas nepalankioms sąlygoms, lėtėja senėjimo procesas bei didėja derlius. Krezoksim-metilas turi labai ilgą apsauginį veikimą.

Epoksikonazolas ir fenpropimorfis – abi šios veiklosios medžiagos yra sisteminės ir stabdo svarbiausių lapų ir varpų ligų plitimą javuose. Epoksikonazolas – ypač

veiksmingas nuo septoriozių, rūdžių, dryžligių, rinchosporiozės, kviečių dryžligės ir dalinai nuo stiebalūžės. Fenpropimorfis – pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu nuo miltligės ir rūdžių.

Allegro Super geriausiai veikia, kai naudojamas profilaktiškai, t.y. prieš pasirodant pirmiems ligos požymiams. Allegro Super pasižymi ir gydomuoju veikimu nuo rūdžių, lapų septoriozės ir miltligės. Rekomenduojama norma 0,75–1,5 l/ha Allegro Super yra veiksminga 4–6 savaites, priklausomai nuo augimo sąlygų ir infekcijos intensyvumo.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, varpų ir lapų septoriozė, dalinai juodligės ir stiebalūžė.	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha bambklėjimo pradžioje (BBCH 30–32).
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, dryžligės, dalinai stiebalūžė.	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha bambklėjimo pradžioje (BBCH 30–32).
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, dryžligė, dalinai stiebalūžė ir juodligės.	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 31–59). Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha bambklėjimo pradžioje (BBCH 30–32).
Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, dalinai stiebalūžė, dalinai juodligės.	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha bambklėjimo pradžioje (BBCH 30–32).

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse, kai ligos plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose, kai ligos plinta silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo intensyvumo bei oro sąlygų.


Didžiausias purškimų skaičius naudojant 1,5 l/ha – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

MAIŠYMAS

Allegro Super galima maišyti su herbicidais Arrat ir Biathlon 4D, augimo regulatoriais Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Terpal, insekticidu Fastac 50, fungicidais Adexar, Ceriax, Duett Ultra, Bell Super, Brutus, Capalo, Corbel, Flexity, Juventus 90, Librax, Opera N, Tango Super, Tango Flex, Tracker, Viverda. Allegro Super galima maišyti taip pat ir su mikroelementinėmis trąšomis. Galima maišyti su karbamidu. Tačiau, jei naudojama karbamido daugiau nei 20 kg/ha (produkto), oro temperatūra viršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė, didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių apdeginimai. Prieš maišymą karbamidą gerai ištirpinkite. Pirma pilamas Allegro Super bei kiti maišymo partneriai, gerai išmaišoma ir po to supilamas ištirpintas karbamidai.

Vandens kiekis – 150–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1–2 val.



Gerai nuo ligų apsaugotuose ploteliuose, lyginant su jau nudžiūvusiais, grūdų derlius kasdien didėja 1–2 cnt/ha.