



# Cabrio® Duo



## Fungicidas

Metoksikarbamatų ir cinamono rūgšties amidų grupės fungicidas, skirtas lauke auginamų svogūnų, česnakų, ‚shallot‘ tipo svogūnų, agurkų, cukinijų, patisonų, aguročių ir sėjamųjų salotų apsaugai nuo netikrosios miltligės.

---

Veikliosios medžiagos:	dimetomorfis 72 g/l piraklostobinas 40 g/l
------------------------	---

---

Produkto forma:	koncentruota emulsija (EC)
-----------------	----------------------------

---

Pakuotė:	5 l
----------	-----

---

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### VEIKIMO BŪDAS

Cabrio Duo yra fungicidas, skirtas lauke auginamų svogūnų, česnakų, ‚shallot‘ tipo svogūnų, agurkų, cukinijų, patisonų, aguročių ir salotų apsaugai nuo netikrosios miltligės.

**Dimetomorfis** yra lokaliai sisteminis ir translaminarinis fungicidas, priklausantis cinamono rūgšties amidų grupei. Jis taip pat įeina į fungicido Acrobat Plus sudėtį.

**Piraklostobinas** priklauso metoksikarbamatų grupei. Jis slopina patogeninių grybų ląstelių kvėpavimo procesą. Turi ir fiziologinį veikimą, kuris vadinamas žalinimo efektu (padidėja atsparumas nepalankioms sąlygoms, lėtėja senėjimo procesas, augalai geriau įsisavina azotą, kaupia anglies dvideginį, pagamina daugiau maisto medžiagų.) Piraklostobinas įeina į Signum, Ceriax, Opera N ir Viverda fungicidų sudėtį.

## AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma, l/ha*	Augimo tarpsnis, BBCH	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų, dienomis	Vandens kiekis, l/ha	Dienų sk. iki derliaus nuėmimo
Svogūnai, česnakai, „shallot“ tipo svogūnai	Netikroji miltligė	2,0–2,5	13–48 (nuo 3 lapelių tarpsnio iki kai pusės augalų lapai pasėlyje nulinkę)	1–3	7–10	200–1000	7
Agurkai, cukinijos, patisonai, aguročiai	Netikroji miltligė	2,0–2,5	11–89 (nuo pirmo tikrojo lapelio tarpsnio iki nuimamas derlius)	1–3	7–10	250–1000	1
Salotos	Netikroji miltligė	2,0–2,5	10–49 (nuo skilči-alapių tarpsnio iki pasiekiamas tipinis dydis, forma ir tvirtumas)	1–3	7–10	200–1000	7

\* Pastaba: Nurodyta norma yra skirta purkšti augalais padengtam plotui. Tais atvejais, kai daržovės yra sėjamos, paliekant santykinai didelius tarpus tarp eilių (pvz., agurkai – 1 m ir daugiau) ir, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose (pvz., išsiskleidę 1–5 tikrieji lapeliai), turint tinkamą purškimo įrangą (purškiama tik siaura juosta virš augalų), normą reikia sumažinti atitinkamai realiai purškiamam plotui. Realiai purškiamas plotas viename hektare žemės apskaičiuojamas pagal formulę: purškiamos juostos plotis (m) x eilių ilgis (m). Jei apskaičiuotas purškiamas plotas yra, pvz., 25 proc. nuo hektaro, tuomet normą reikia sumažinti iki 25 proc., t. y. nuo 2,0–2,5 l/ha iki 0,5–0,625 l/ha.

### ŠALIA AUGANTYS AUGALAI

Stenkitės, kad purškiamo tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.

### MAIŠYMAS

Cabrio Duo galima maišyti su Acrobat Plus, Signum. Dėl produktų maišymo kreipkitės į produktų gamintojus ar atstovus.

### ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Dviejų veikliųjų medžiagų kombinacija produkte Cabrio Duo jau užtikrina mažesnę atsparumo išsivystymo riziką, tačiau nepaisant to, naudojant Cabrio Duo būtina laikytis atsparumo riziką mažinančių priemonių:

- produktą tame pačiame pasėlyje naudokite ne daugiau kaip 3 kartus;
- laikykitės rekomenduojamų normų;
- purškite nuo rekomenduojamų ligų ir nurodytu augalų augimo tarpsniu;
- purškite profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams;

Fungicidų naudojimas nepanaikina būtinybės sėti ligoms atsparias veisles, taikyti sėjomainą, naudoti sveiką sėklinę medžiagą ir laikytis geros žemės ūkio praktikos.