



# Capalo®



## Fungicidas

Sisteminis morfolinų, benzofenonų ir triazolų grupės fungicidas skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių rugių bei žieminių ir vasarinių miežių, avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos:	epoksikonazolas 62,5 g/l fenpropimorfis 200 g/l metrafenonas 75 g/l
Produkto forma:	vandeninė suspoemulsija
Pakuotė:	10 l

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### VEIKIMO BŪDAS

Capalo yra sisteminis fungicidas, kurio visos trys veikliosios medžiagos turi apsauginį, gydomąjį ir naikinamąjį veikimą nuo grybinių ligų. Veiklioji medžiaga **epoksikonazolas** priklauso triazolų grupės fungicidams. Jis gerai ir ilgam apsaugo nuo visų svarbiausių ligų, tokių kaip septoriozės, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, dryžligės, rūdys.

**Fenpropimorfis** priklauso kitai fungicidų grupei – morfolinams. Jis labai greitai patenka į augalą, turi labai gerą apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo miltligės, rinchosporiozės ir rūdžių, be to, gerai veikia ir vėsiu oru (nuo +6°C).

Trečia Capalo veikioji medžiaga – **metrafenonas** priklauso benzofenų cheminei grupei. Jis pasižymi unikaliu veikimo būdu – turi apsauginį, gydomąjį ir antisporuliacinį poveikį nuo miltligės, iš dalies veiksmingas ir nuo stiebalūžės.

Panaudojus 1,0–2,0 l/ha Capalo, javai apsaugomi nuo ligų 3–4 savaites, priklauso mai nuo augimo sąlygų ir ligų išplitimo. Po nupurškimo fungicidas patenka į augalą, kai tik tirpalas nudžiūna nuo lapų paviršiaus. Po valandos prasidėjęs lietus neturi jokios neigiamos įtakos fungicido veikimui.

## AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė*	2,0	Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė*	1,0–2,0	Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	1,0–2,0	Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams arba profilaktiškai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys	2,0	Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, stiebalūžė*	2,0	Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).

\* Nuo stiebalūžės purškiama 2,0 l/ha Capalo bambklėjimo pradžioje (BBCH 31-32).

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse, kai ligos plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose, kai ligos plinta silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo intensyvumo bei oro sąlygų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1, purškiant po 1,0 l/ha – 2.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

## MAIŠYMAS


Capalo galima maišyti su herbicidais Arrat ir Biathlon 4D, augimo regulatoriais Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Terpal, insekticidu Fastac 50 ir kitais BASF fungicidais taip pat su mikroelementinėmis trąšomis.

Į purkštuvo baką supylę Capalo gerai išmaišykite ir tik po to pilkite kitą produktą. Atidžiai perskaitykite maišomų produktų naudojimo rekomendacijas.

- Atminkite, kad Terpal į mišinius visada pilamas paskutinis!
- Capalo galima maišyti su karbamidu. Tačiau jei karbamido naudojama daugiau nei 20 kg/ha (produkto) ir oro temperatūra viršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė, didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių augalų apdeginimai.
- Prieš maišymą karbamidą gerai ištirpinti. Pirma pilamas Capalo bei kiti maišymo partneriai, gerai išmaišoma ir po to supilamas ištirpintas karbamidas.

Vandens kiekis – 200–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.



Padengimas ir išsilaikymas ant lapo paviršiaus