



# Effector<sup>®</sup>



Fungicidas

Kontaktinis fungicidas obelių, kriaušių, slyvų, vyšnių, juodųjų, raudonųjų serbentų, agrastų ir aviečių apsaugai nuo vaisių ir lapų ligų.

Veiklioji medžiaga:	ditianonas 700 g/kg
Produkto forma:	vandenyje dispersiškos granulės
Pakuotė:	5 kg

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### VEIKIMO BŪDAS

Effector yra kontaktinis fungicidas sėklavaisių, kaulavaisių ir uogakrūmių apsaugai nuo grybinių lapų ir vaisių ligų. Nėra žinoma jam atsparių parazitinių grybų rasių. Effector sustabdo infekcijos plitimą, jį panaudojus per 48 valandas nuo infekcijos pradžios. Effector pasižymi labai geru atsparumu lietai, todėl skirtingai nei kiti kontaktiniai fungicidai, apsaugo 10–14 dienų.



## AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma kg/ha	Naudojimas
Obelys	Obelių rauplės, filostiktozė, paprastasis obelių vėžys, rūdys, rudasis puvinys	0,5–1,0	Purškama 2–6 kartus, dar prieš pumpurams sprogstant, 8–14 dienų intervalais, priklausomai nuo oro sąlygų.
Kriaušės	Kriaušių rauplės, kriaušių rūdys, degligė	0,75–1,0	Purškama 2–6 kartus, pradedant nuo žaliojo kūgio tarpsnio 7–14 dienų intervalais.
Vyšnios, trešnės	Kokomikozė, vyšnių rauplės, šratligė, moniliozė, vaisių puviniai	0,5–1,0	Pradėti purkšti prieš žydėjimą 2-4 kartus 14 dienų intervalais.
Slyvos	Šratligė, rūdys, moniliozė	0,75–1,0	Purškama 2-4 kartus. Pradėti purkšti prieš žydėjimą su 14 dienų intervalais.
Juodieji ir raudonieji serbentai, agrastai	Šviesmargė, deguliai, rūdys, miltligė	0,5–1,0	Purškama 2–4 kartus, vos tik pasireiškus ligai, 10–14 dienų intervalais
Avietės	Deguliai, aviečių šviesmargė, žievėplaiša, rūdys, pilkasis puvinys	0,75–1,0	Purškama 2–4 kartus, vos tik pasireiškus ligai, 10–14 dienų intervalais.

## VANDENS KIEKIS

Obelims, kriaušėms, vyšnioms, trešnėms, slyvoms: 700–1000 l/ha.

Serbentams, agrastams, avietėms: 500 l/ha.

## MAIŠYMAS

Effector galima maišyti su dauguma insekticidų, pvz. su Fastac 50 ir fungicidais Candit, Effector, Signum, augimo reguliatoriumi Regalis Plus, jei purškimo laikas sutampa. Nemaišykite su sieros milteliais ar šarminėmis medžiagomis kaip kalkės, Bordo mišinys, nemaišykite su aliejais.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 21 diena.