



# Efilor<sup>®</sup>



## Fungicidas

Sisteminis triazolų ir karboksamidų grupės fungicidas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos:	boskalidas 133 g/l metkonazolas 60 g/l
Produkto forma:	koncentruota suspensija
Pakuotė:	5 l

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### VEIKIMO BŪDAS

Efilor sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų – boskalido ir metkonazolo.

**Boskalidas** yra sisteminio ir translaminarinio veikimo, todėl patekęs į augalo lapus, juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir nenupurkštos augalo dalys. Veiklioji medžiaga rapsuose naudojama apsaugai nuo labiausiai plintančių ligų: baltojo puvinio, fomezės ir juodosios dėmėtligės.

**Metkonazolas** yra plataus veikimo veiklioji medžiaga, turinti apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo tokių ligų rapsuose, kaip: juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė, fomezė ir pilkasis kekerinis puvinys. Metkonazolas yra sisteminio veikimo ir pasižymi akropetaliumi (iš apačios į viršų) judėjimu.

## **Naudojimo apribojimai!**

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

## **AUGALAI IR LIGOS**

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys*, pilkasis kekerinis puvinys	0,7–1,0	Žydėjimo metu, pradėjus kristi pirmiems žiedlapiams (BBCH 63–65).
	Juodoji dėmėtligė		Žydėjimo pabaigoje arba ligai pradėjus plisti ant ankštarių (BBCH 69–75).

\*Purškiant nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, bus dalinai apsaugota ir nuo pilkojo kekerinio puvinio.

## **MAIŠYMAS**

Efilor galima maišyti su insekticidu Fastac 50, taip pat su fungicidais Juventus 90, Cantus, Cantus Gold, herbicidais Focus Ultra, Butisan Kombi, Butisan Avant, Butisan Star, Focus Ultra, augimo reguliatoriumi Caryx ir skystomis trąšomis *Nutribor*. Darant mišinius, maišyklė turi visą laiką dirbti. Jei mišiniai putoja, naudokite produktus putojimui sumažinti.

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Efilor ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Neruoškite daugiau mišinio, nei planuojate sunaudoti.

## **VANDENS KIEKIS**

Rekomenduojamas vandens kiekis 200–400 l/ha. Vandens kiekį rinkitės atsižvelgdami į augalų tankumą ir aukštį. Augalų lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu. Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose 300–400 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius žieminuose ir vasariniuose rapsuose – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos.

Laikotarpis be lietaus 1val.