



# Flexity<sup>®</sup>



## Fungicidas

Sisteminis benzofenonų cheminės klasės fungicidas, naudojamas žieminių kviečių apsaugai nuo miltligės ir stiebalūžės, vasarinių kviečių bei žieminių ir vasarinių miežių apsaugai nuo miltligės.

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Veiklioji medžiaga: | metrafenonas 300 g/l    |
| Produkto forma:     | koncentruota suspensija |
| Pakuotė:            | 1 l                     |

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### VEIKIMO BŪDAS

Flexity yra fungicidas, turintis ilgalaikį poveikį nuo javų miltligės. Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose naudojamas krūmijimosi pabaigoje – antro bamblio tarpsnyje (BBCH 30-32), jis veiksmingas ir nuo žieminių kviečių stiebalūžės.

Flexity veiklioji medžiaga metrafenonas priklauso benzofenonams. Metrafenono veikimas yra lokaliai sisteminis, turintis apsauginį ir gydomąjį poveikį. Metrafenonas, patekęs ant grybienos, neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti sporoms. Maksimali rekomenduojama norma 0,5 l/ha Flexity veikia iki 6 savaičių, priklausomai nuo ligos intensyvumo ir oro sąlygų. Geriausiai Flexity veikia, kai naudojamas profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

## AUGALAI IR LIGOS

| Augalai                          | Ligos      | Norma l/ha | Naudojimas   |
|----------------------------------|------------|------------|--|
| Žieminiai ir vasariniai kviečiai | Miltligė   | 0,5        | Purškiama bambklėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30-65). Norėdami sustiprinti gydomąjį veikimą nuo miltligės, naudokite 0,25 l/ha Flexity + 0,25 l/ha Corbel mišinį. Didžiausias purškimų skaičius nuo miltligės, naudojant 0,5 l/ha – 1. |
| Žieminiai kviečiai               | Stiebalūžė | 0,5        | Purškiama bambklėjimo pradžioje – antro bamblio tarpsnyje (BBCH 30-32). Didžiausias purškimų skaičius – 1. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.  |
| Žieminiai ir vasariniai miežiai  | Miltligė   | 0,5        | Purškiama bambklėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30–65). Didžiausias purškimų skaičius, naudojant 0,5 l/ha – 1. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.  |

## MAIŠYMAS

Flexity galima maišyti su herbicidais Arrat ir Biathlon 4D, augimo regulatoriais Cycocel 750, Terpal, Medax Max, Medax Top, insekticidu Fastac 50, fungicidais Adexar, Allegro Super, Bell Super, Brutus, Ceriax, Duett Ultra, Opera N, Tango Super, Tracker ir kt. Flexity taip pat galima maišyti su mikroelementinėmis trąšomis.

- Atminkite, kad Terpal į mišinius visada pilamas paskutinis!
- Galima maišyti su karbamide, jei naudojate ne daugiau kaip 20 kg/ha (produkto) ir oro temperatūra neviršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė. Jei didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių apdeginimai.
- Prieš maišydami, karbamidą gerai ištirpinkite. Pirmiausiai pilamas Flexity bei kiti maišymo partneriai, po to ištirpintas karbamide.

Vandens kiekis – 200–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.