



Osiris[®] Star



Fungicidas

Sisteminis triazolų grupių fungicidas, naudojamas žeminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvieturgiuose, rugiuose apsaugai nuo grybinių lapų ir varpų ligų.

Veiklosios medžiagos:	epoksikonazolas 56,25 g/l metkonazolas 41,25 g/l
Produkto forma:	koncentruota emulsija
Pakuotė:	10 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Osiris Star yra plataus veikimo spektro sisteminis fungicidas, veiksmingas nuo daugelio lapų ir varpų ligų. Jis sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų: epoksikonazolo ir metkonazolo, kurios priklauso triazolų grupės fungicidams. Triazolai sutrikdo ergosterolio, kuris yra patogeninių grybų ląstelių membranos sudėtyje, gamybą. Suardžius parazitinio grybo membranas, sustabdomas ligos vystymasis.

Osiris Star labai veiksmingas nuo lapų ir varpų septoriozių, rūdžių ir rinchosporiozės, nuo varpų fuzariozės, kviečių dryžligės, tinkliškosios ir kitų dryžligių miežiuose ir iš dalies veiksmingas nuo miltligės.

Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo intensyvumo bei oro sąlygų. Osiris Star 1,33 l/ha po nupurškimo užtikrina 3-5 savaitių javų apsaugą nuo ligų. Dėl itin geros produkto formos Osiris Star įsivavinamas per 0,5-1 valandą po nupurškimo, todėl 1 valandą po nupurškimo praėjęs lietus neturi jokios neigiamos įtakos

jo veikimui. Apsaugojus javus nuo varpų fuzariozės, žymiai sumažėja mikotoksinų kiekis grūduose.

Osiris Star – tai ne vien tik dvi stipriausios triazolų grupės veikliosios medžiagos, bet tai pat ir pažangi produkto forma, kurioje yra labai didelis kiekis paviršiaus aktyviųjų medžiagų, papildų, lydinčių medžiagų, kurios užtikrina geresnę veikliųjų medžiagų veikimą, įsisavinimą, pasiskirstymą augale, labai gerą padengimą, išskirtinai gerą atsparumą lietu.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai ir kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, varpų fuzariozė, miltligė*	1,0–1,33	Nuo lapų ligų kviečiai purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40–69). Nuo varpų fuzariozės purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–65). * Jei stipriai plinta miltligė, pridėkite Corbel arba Flexity
Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys	1,0–1,33	Žieminiai rugiai purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40–69).

Jei purškiama du kartus:

- pirmą kartą kviečius purškite nuo vamzdelėjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 40–45),
- antrą kartą purškite nuo pirmųjų akuotų pasirodymo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 49–69).

MAIŠYMAS

Osiris Star gali būti maišomas su augimo regulatoriais Medax Top, Medax Max, Cycocel, Terpal, fungicidais Adexar, Ceriax, Allegro Super, Bell Super, Brutus, Capalo, Corbel, Duett Ultra, Flexity, Opera N, Tracker, Viverda, insekticidais Fastac 50 ir kt.

Vandens kiekis – 200–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 0,5–1 val.