



Scala[®]



Fungicidas

Kontaktinio ir lokaliai sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas nuo rauplių obo-lyse, kriaušėse ir pilkojo puvinio braškėse, auginamose atviraime grunte arba po danga.

Veiklosios medžiagos:	pirimetanilas 400 g/l
Produkto forma:	koncentruota suspensija
Pakuotė:	5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Scala veikia kaip apsauginis ir lokaliai sisteminis fungicidas, sutrikdantis grybinių ligų fermentinę sistemą. Veiklioji medžiaga pirimetanilas priklauso anilinopirimidinių grupei, blokuojančiai fermentų vystymąsi, dėl kurio sustoja parazitinių grybų augimas.

Scala labiausiai tinka ankstyviesiems purškimams, nes gerai veikia net esant žemai temperatūrai, pradedant nuo +5°C.

Braškės nuo pilkojo puvinio paprastai purškiamos žydėjimo metu. Scala braškėse naudojamas vieną kartą, kai planuojami 2–3 purškimai nuo pilkojo puvinio. Jei planuojami 4–6 purškimai nuo pilkojo puvinio, Scala naudojamas 2 kartus, tačiau purškiami ne 2 kartus iš eilės, o kaitaliojant su kitais augalų apsaugos produktais.

Rekomenduojama fungicidą Scala naudoti mišinyje su Delan Pro ar Effector.

AUGALAI IR LIGOS

Šis mišinys užtikrina dvigubą apsaugą nuo obelių ir kriausių rauplėlių.

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Obelys ir kriaušės	Obelių ir kriausių rauplės	1,1	Nuo „žaliojo kūgio“ tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 53–69).
		0,75	Vėlesnieji tarpsniai po žydėjimo, nuo vaisiaus padidėjimo iki 10 mm iki vaisius pasiekia apie 70 % būdingo dydžio (BBCH 71–77). Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos. Didžiausias purškimų skaičius – 4. Purškama 7–10 dienų intervalais.
Braškės atvirame grunte arba po danga	Pilkasis kekerinis puvinys	1,5–2,0	Nuo žydėjimo pradžios iki vaisiaus brandos, antrasis derlius: dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 60–89). Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 3 dienos. Didžiausias purškimų skaičius – 2. Purškama 7–14 dienų intervalais.

DĖMESIO!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Purškimų nuo ligų dažnumas priklauso nuo ligų išsivystymo ir augalų augimo intensyvumo, bet paprastai apsauginis poveikis trunka 7 dienas. Gydomasis poveikis paprastai trunka 2–3 dienas, vėsesniu oru – šiek tiek ilgiau.

MAIŠYMAS

Galima maišyti su Delan Pro, Effector, Candit, Regalis Plus.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švari vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Scala ir laikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purškite.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams 200–400 l/ha, sodams iki 1000 l/ha. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštuose medžiuose naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.