



Tango[®] Super



Fungicidas

Morfolinų ir triazolų grupės sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, žieminių ir vasarinių miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos:	fenpropimorfis 250 g/l epoksikonazolas 84 g/l
Produkto forma:	suspensija-emulsija
Pakuotė:	5 l, 10 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Tango Super yra sisteminis fungicidas. Abi veikliosios medžiagos, fenpropimorfis ir epoksikonazolas, patenka į augalą per jo žalias dalis ir labai greitai pasiskirsto po visą augalą. Tango Super panaudojimas užtikrina 3–5 savaičių apsauginį laikotarpį, priklausomai nuo augalų augimo ir infekcijos intensyvumo. Tango Super stabdo pagrindinių grybinių ligų vystymąsi ir kartu nuo jų apsaugo. Geriausias efektas pasiekiamas, kai grybinės ligos tik pradeda plisti. Jei infekcija pasireiškia anksti, reikalingas pakartotinis purškimas. Apdorojimų laikas ir skaičius priklauso nuo ligos rūšies ir intensyvumo.

Tango Super javuose labai veiksmingas nuo septoriozių, dryžligių, rinchosporiozės, rūdžių, miltligės.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, dryžligės, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, lapų septoriozė	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–59).
Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Avižos	Miltligė	0,75–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse, kai ligos plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose, kai ligos plinta silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo intensyvumo bei oro sąlygų.

Didžiausias purškimų skaičius 1,5 l/ha – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

MAIŠYMAS

Tango Super galima maišyti su Arrat, Biathlon 4D, Fastac 50, Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Terpal, Adexar, Ceriax, Allegro Super, Bell Super, Brutus, Corbel, Flexity, Opera N ir kt. Tango Super galima maišyti taip pat ir su mikroelementiniais trąšomis.

- Maišydami su Terpal atminkite, kad jis į mišinius visada pilamas paskutinis!
- Galima taip pat maišyti su karbamiidu. Jei naudojama daugiau nei 20 kg/ha karbamiido (produkto) norma ir oro temperatūra viršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė, didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių kviečių apdeginimai.
- Prieš maišymą, karbamidą reikia gerai ištirpinti. Pirmą pilamas Tango Super bei kiti maišymo partneriai, o po to ištirpintas karbamidas.

Vandens kiekis – 200–300 l/ha.

Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose – 300–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1–2 val.