



Alverde®



Insekticidas

Kontaktinio ir vidinio veikimo semikarbazonų cheminės grupės insekticidas bulvių apsaugai nuo kolorado vabalų.

Veikioji medžiaga:	metaflumizonas 240 g/l
Produkto forma:	koncentruota suspensija
Pakuotė:	1 l, 5 l, 10 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Alverde yra kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas iš semikarbazonų cheminės grupės.

Tai pirmasis insekticidas, kurio veikioji medžiaga yra metaflumizonas.

Insekticidas veikia tiek kolorado vabalų lervas, tiek suaugėlius. **Metaflumizonas** sukelia staigų kenkėjų paralyžių. Jie tuoj pat nustoja būti ir žūva po kelių dienų. Kolorado vabalų atmaina, kuri turi padidintą atsparumą kitų grupių insekticidams, tokiems kaip piretroidai, yra jautri ir gali būti naikinama naudojant Alverde.



AUGALAI IR KENKĖJAI

Augalai	Norma l/ha	Naudojimas
Bulvės	0,25	Purškama, kai plinta kolorado vabalai ir jų lervos. Didžiausias apdorojimų skaičius – 2. Intervalai tarp purškimų 7–10 dienų. Laikotarpis nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

PURŠKIMAS

Pirmą kartą purškama, pasirodžius pirmiesiems kolorado vabalams.

Geriausias veikimas, kai naikinamos jaunos vabalų lervos. Išsiritus kitai kolorado vabalų kartai arba pasirodžius naujam kenkėjų antplūdžiui, purškimą reikia kartoti. Norint išlaikyti gerą ir ilgalaikį poveikį, purškiant Alverde reikia labai tolygiai padengti visą augalų lapų paviršių.

Alverde poveikis išlieka 7–14 dienų, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų ir augalų augimo intensyvumo.

TIRPALO PARUOŠIMAS

2/3 purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Prieš pildami į rezervuarą Alverde, gerai suplakite. Įpilkite reikiamą kiekį Alverde, kitą produktą ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą viso purškimo metu.

MAIŠYMAS

Alverde galima maišyti su fungicidais Acrobat Plus, Orvego, Signum, insekticidu Fastac 50. Prieš maišydami, atidžiai perskaitykite produktų maišymo rekomendacijas.

ATSPARUMAS

Norint išvengti atsparumo išsivystymo, vieną kenkėjų generaciją purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 valanda.

