



Rovral® Aqua Flo



Beicas

Kontaktinio veikimo karboksamidų grupės fungicidas, skirtas sėklų beicavimui ir augalų apsaugai vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Kaip beicas Rovral Aqua Flo naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų, dekoratyvinių augalų sėklų ir bulvių gumbų beicavimui.

Kaip fungicidas Rovral Aqua Flo naudojamas žirnių, Briuselio kopūstų, braškių, aviečių, augalų sėklų ir purškimui vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Veiklioji medžiaga:	iprodonas 500 g/l
Produkto forma:	vandeninė koncentruota suspensija
Pakuotė:	1 l, 5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Fungicidu Rovral Aqua Flo galima purkšti augalus jų vegetacijos metu ir naudoti sėklų beicavimui.

AUGALAI IR NORMOS

REKOMENDACIJOS SĖKLŲ BEICAVIMUI

Rovral Aqua Flo – fungicidinis beicas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žirnių, pupų, kopūstų ir svogūnų sėklų bei sėklinių bulvių gumbų beicavimui. Rovral Aqua Flo saugo nuo per sėklą ir per dirvą plintančių ligų sukėlėjų. Rovral Aqua Flo yra kontaktinis beicas, todėl beicuojuot reikia kuo vienodžiau padengti visą sėklos paviršių. Beicuokite sausas sėklas prieš pat augalų sėją/sodinimą.

Augalai	Ligos	Norma, l/100 kg sėklos	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai rapsai, kopūstai	Juodoji dėmėtligė, fomezė	0,5	Beicavimui naudokite daigias, išvalytas ir mechaniškai nepažeistas sėklas. Beicavimui Rovral Aqua Flo galima naudoti neskiestą ir skiestą vandeniu. Po beicavimo, sėklas supilkite į maišus ir laikykite sausose patalpose. Sėkite tuoj pat po beicavimo. Likusių nuo sėjos sėklų nelaikykite ilgiau kaip 12 mėn.
Bulvės	Rizoktoniozė	0,02	Tirpalas skirtas bulvių beicavimui turi būti išpurkštas kaip įmanoma vienodžiau ir padengti visą bulvės paviršių. Ant bulvių neturi būti likusių žemių. Jei beicuojama bulvių sodinimo mašinoje, geriausia, kad būtų naudojami du purkštukai vienai vagai. Beicuotų bulvių gumbų maišuose nelaikykite ilgiau kaip 3 mėnesius.

PASTABOS

- Sėklos beicavimas su Rovral Aqua Flo gali pakeisti sėklų išbyrėjimo greitį sėjamosiose. Kiekvieną kartą naudodami sėjai beicuotas sėklas, iš naujo nusistatykite sėklų normą.
- Tirpalo paruošimas – beicavimui Rovral Aqua Flo naudojamas neskiestas arba skiestas vandeniui iki reikiamo tirpalo kiekio. Vandens kiekis turi būti pasirenkamas, atsižvelgiant į sėklų beicavimo mašinų gamintojų rekomendacijas.
- Kai beicuojant Rovral Aqua Flo reikia skiesti vandeniu, pirmiausiai į beicavimo mašinos rezervuarą įpilamas ½ vandens, po to Rovral Aqua Flo ir vėl vanduo iki reikiamo kiekio. Gerai išmaišykite ir, jei yra galimybė, maišykite viso beicavimo metu.



Rovral® Aqua Flo



Fungicidas

Kontaktinio veikimo karboksamidų grupės fungicidas, skirtas sėklų beicavimui ir augalų apsaugai vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Kaip beicas Rovral Aqua Flo naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų, dekoratyvinių augalų sėklų ir bulvių gumbų beicavimui.

Kaip fungicidas Rovral Aqua Flo naudojamas žirnių, Briuselio kopūstų, braškių, aviečių, augalų sėklų ir purškimui vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Veiklioji medžiaga: iprodionas 500 g/l

Produkto forma: vandeninė koncentruota suspensija

Pakuotė: 1 l, 5 l



NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Fungicidu Rovral Aqua Flo galima purkšti augalus jų vegetacijos metu.

VEIKIMO BŪDAS

Rovral Aqua Flo yra kontaktinis fungicidas, kuris apsaugo tik apipurkštas augalo dalis, todėl labai svarbu purškiant gerai padengti augalų lapų paviršius. Rovral Aqua Flo naudokite tik profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

Nepurškite augalų, kurie dar neatsigavo po kitų augalų apsaugos produktų panaudojimo, kai trūksta maisto medžiagų, esant sausrui, aukštai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Nepurškite dažniau nei kas 7 dienas, galite pažeisti augalus.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žirniai	Pilkasis kekerinis puvinys	1,0	Žydėjimo pradžia Vandens kiekis: 400 l/ha
Briuselio kopūstai	Juodoji dėmėtligė (alternariozė)	1,5	Purškite 4–6 savaitės iki derliaus nuėmimo. Vandens kiekis: 200–300 l/ha
Braškės	Pilkasis kekerinis puvinys	1,5	Purškite 3 kartus: 1. Žydi 5–10% žiedų (BBCH 61). 2. Žydi 50–80% žiedų (BBCH 65–68). 3. Žydėjimo pabaiga, visi vainiklapiai nukritę (BBCH 69). Vandens kiekis: 400–1000 l/ha
Avietės	Pilkasis kekerinis puvinys	1,0–1,5	Purškite 3 kartus: 1. Žydi 5–10% žiedų (BBCH 61). 2. Žydi 50–80% žiedų (BBCH 65–68). 3. 14 dienų prieš derliaus nuėmimą. Vandens kiekis: 1000 l/ha
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų. Didžiausias purškimų skaičius – 3.			

POVEIKIS BITĖMS

Purškiant žydinčius augalus, naudokite ne mažiau kaip 400 l/ha vandens. 1,0–1,5 l/ha Rovral Aqua Flo su 200–300 l/ha vandens gali pakenkti bitėms ir kamanėms. Tirpalo koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,25%.

VENKITE ATSPARUMO!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veikliosioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti preparatų veiksmingumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir preparato naudojimo. Norint išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą BASF preparato normą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

¾ purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Rovral Aqua Flo ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką.

MAIŠYMAS

Rovral Aqua Flo gali būti maišomas su Fastac 50, Fury® 100 EW, Acrobat Plus, Effector, Signum, Candit.

Laikotarpis be lietaus – 4 valandos.