

# Flexity®

## Flexity 300 g/l k.s.

**BASF**

The Chemical Company

### FUNGICIDAS

Fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių laukuose nuo miltligės ir stiebalūžės bei žieminių ir vasarinių miežių laukuose nuo miltligės. Skirtas profesionaliam naudojimui.

#### Flexity 300 g/l k.s.

**Veikioji medžiaga:** metrafenonas 300 g/l  
**Produkto forma:** koncentruota suspensija  
**Registracijos numeris:** 0311F/07

#### DĖMESIO!

Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.  
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pokyčius  
Saugoti nuo vaikų  
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro  
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti  
Vengti patekimo ant odos  
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos  
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**  
**SEKIANT IŠVĖNGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

Pakuotė: **1 l e**

**Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 22 73 112**

**Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112**

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 23 62 052**

**Registracijos savininkas:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhaga S, Danija

**Gamintojas:** BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

**Gamintojo atstovas:** BASF UAB, Sausio 13-osios g-vė 4A, LT-04343 Vilnius, Lietuva.

Tel.: 8-5 210 74 50, Faksas: 8-5 210 74 58



Aplinkai pavojingas

**Suuntos numeris:** žiūrėkite ant pakuotės  
**Pagamavimo data:** žiūrėkite ant pakuotės  
**Galiojimo laikas:** 2 metai nuo pagaminimo datos

#### Pirmoji pagalba

**Bendras patarimas:** nedelsdami nusivilkite sulietus drabužius.

**Patekus ant odos:** kruopščiai nuplaukite odą su muilu. Jei atsiranda peršėjimas, kreipkitės į gydytoją.

**Įkvėpus:** nurašinkite nukentėjusį, išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsdami plaukite atmerktas akis gausiu tekančiu vandeniu kiekiau 15 minučių, vėsumkite su okulistu.

**Prarijus:** NESUKELKITE VEMIMO, skalkukite burną, po to gerkite daug vandens.

**Informacija gydytojui:** Specifinio priešnuodžio nėra, gydymas - simptominis.

#### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

##### Veikimo būdas

Flexity yra fungicidas, turintis ilgalaikį poveikį nuo javų miltligės. Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose naudojamas krumjimosi pabaigoje – antro bamblo tarpsnyje (BBCH 30-32), jis efektyviai veikia ir nuo stiebalūžės.

Flexity veikioji medžiaga metrafenonas priklauso visiškai naujai cheminei grupei – benzofenonams. Metrafenono veikimas yra lokaliai sisteminis, turintis apsauginį ir gydymąjį poveikį. Metrafenonas, patekęs ant grybenos, neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti sporoms. Maksimali rekomenduojama norma 0,5 l/ha Flexity veikia iki 6 savaičių, priklausomai nuo ligos intensyvumo ir oro sąlygų. Veiksmingiausiai Flexity veikia, kai naudojamas profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

##### AUGALAI IR LIGOS

###### Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Miltligė *Blumeria graminis*  
**Norma:** 0,25-0,5 l/ha Flexity bambėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30 – 65). Mažiausią rekomenduojamą normą naudokite miltligei atsparesnėse veislėse, kai liga plinta neintensyviai. Jei oro sąlygos palankios ligoms vystytis, normą didinkite arba purškite du kartus po 0,25 l/ha Flexity 3-4 savaičių intervalu. Noredami sustiprinti gydymąjį veikimą nuo miltligės, Flexity naudokite mišiniuose su Corbel™: 0,25 l/ha Flexity + 0,25 l/ha Corbel™.

**Didžiausias purškimų skaičius nuo miltligės, naudojant 0,5 l/ha – 1**

###### Stiebalūžė *Oculimaculosa spp.*

**Norma:** 0,5 l/ha Flexity bambėjimo pradžioje – antro bamblo tarpsnyje (BBCH 30-32).

###### Didžiausias purškimų skaičius – 1

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos**

###### Žieminiai ir vasariniai miežiai

Miltligė *Blumeria graminis*  
**Norma:** 0,25-0,5 l/ha Flexity bambėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30-65). Mažiausią rekomenduojamą normą naudokite ligoms atsparesnėse veislėse, kai ligos plinta neintensyviai. Purškiama profilaktiškai ar tik išryškėjus pirmiesiems miltligės požymiams. Jei oro sąlygos palankios ligoms vystytis, normą didinkite arba purškite du kartus po 0,25 l/ha Flexity 3-4 savaičių intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius, naudojant 0,5 l/ha – 1**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos**

® = BASF registruotas prekės ženklas

®1 = Syngenta Crop Protection AG registruotas prekės ženklas

#### Venkite atsparumo!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti produktų veiksmingumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybę gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir produkto naudojimo. Norint išvengti veiksmingumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą rekomenduojamą produkto normą.

#### Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 l/ha.

#### Tirpalo paruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Prieš naudojimą produktą gerai suplakte. Įplikite reikiamą kiekį Flexity, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams naudokite tik švarų vandenį.

#### Purškimas

Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu purškiant nemažinti vandens kiekio, ypač jei pašelis yra labai tankus. Po purškimo turėtų praėti 1 valanda be lietaus.

#### Sandėliavimas

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +35°C.

#### Saugos priemonės

Dirbdami laikykitės asmens higienos reikalavimų. Dėvėkite neperšlampačius apsauginius drabužius, cheminius medžiagoms atsparius pirštines, guminius batus, hermetiškai prigludančius apsauginius akinius ir respiratorius nuo skystų ir kietų kenksmingų medžiagų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtina plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukus ir baigę darbą.

#### Pakuotės nukenksminimas ir likučių sunaudojimas

Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite pakuotę 3 kartus, supilkite išplovus į purkštuvo rezervuarą ir išpurškite ant nupurkštų plotų. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

#### Pastaba!

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti produkto veiksmingumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalime numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne pagal paskirtą ar rekomendacijas.



4 0 1 4 3 4 8 1 4 7 5 6 7 9

81044626 LT 0119-Lithuania