

LT

Fury 100 g/l v.e.

Veikloji medžiaga: zeta-cipermetrinas 100 g/l

Preparato forma: vandeningė emulsija

Piretroidinis insekticidas, naudojamas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, rapsų ir bulvių kenkėjų naikinimui. Skirtas profesionaliam naudojimui.

DĖMESIO!

Kenksminga įkvėpus ir prarijus

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Laikyti užrakintą, vaikams neprieinamoje vietoje

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

Vengti patekimo ant odos

Mūvėti tinkamas pirštines

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370-5-2362052.

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112.

Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

Registracijos numeris: 02131/06

Siuntos numeris / Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki +40°C

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Gamintojo atstovas:

BASF UAB, Sausio 13-osios 4A,
LT - 04343, Vilnius, Lietuva
Telefonas: 8-5 210 7450
Faksas: 8-5 210 7458

Atstovas:

BASF A/S, Ved Stadsgraven 15;
DK-2300 Kopenhaga S; DANLIJA

Gamintojas:

FMC Chemical sprl
9, Boulevard de la Plaine
B-1050 Brussels, Belgium

FMC[®]

Xn



**KENKSMINGAS
KAITIGS**

N



**APLINKAI PAVOJINGAS
BIŠTAMS VIDEI**

Pakuotė / Neto:

1,0 L e

10051715-15071598

LV

Furi 100 e.ū.

Darbīgā vielā: zeta-cipermetrīns 100 g/l - Emulsija ūdenī

Insekticīds kaitīgā apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu, ziemas un vasaras rapsža, zirņu un cukurbiēšu sējumos un kartupeļu un kāpostu stādījumos.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: cipermetrīns

R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot

R43 Saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

S2 Sargāt no bērniem

S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību

S20/21 Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu

S24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas

S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā

S37 Strādāt aizsargcimdos

S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu

S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu

S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas

Var izraisīt ūšanas traucējumus

Emergency information, telefon: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

Reģistrācijas Nr. 0256

Reģistrācijas klase 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma

Uzglabāšana: Glabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā sausā, aizslēdzamā, labi vēdināmā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40°C. Izvairīties no aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt!

Derīguma termiņš: Glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Pārstāvniecība:

BASF Agro, Rīga, Mazā Nometņu 45/53,
tāl. 67 508 250, fakss 67 508 251

FMC[®]

Razotājs / Reģistrētājs:

FMC Chemical, sprl,
Boulevard de la Plaine 9,
B-1050, Brussels, Beļģija

LT

Pirmoji pagalba

Bendras patarimas: venkite patekimo ant odos ir drabužių. Sulaistytus drabužius nusivilkite nedelsdami.

Įkvėpus: nedelsdami išeikite į gryną orą, jei pasijusite blogai, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplaukite odą vandeniu su muilu, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite atmerktas akis gausiu tekančio vandens kiekiu 15 minučių, jei atsiradda perštėjimas, kreipkitės į okulistą.

Prarijus: nedelsdami skalaukite burną, po to gerkite daug vandens. Sutelkite dėmesį. Kreipkitės į gydytoją. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, neduokite nieko gerti, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pastaba gydytojui: specifinio priešnuodžio nėra, gydymas - simptominis.

AUGALAI	Norma l/ha	Kenkėjai	
Žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai	0,07 - 0,10 0,07 - 0,10 0,07 - 0,10	Amarai Lemai Javiniai pjūkleliai	<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> <i>Lema melanopus</i> <i>Pachynematus clitellatus</i>
Žieminiai kvietrugiai	0,15	Javiniai tripsai	<i>Limothrips spp.</i> <i>Anaphothrips obscurus</i>
Žieminiai ir vasariniai rapsai	0,07 - 0,10 0,07 - 0,10 0,07 - 0,10	Spragės Rapsinės spragės Rapsiniai žiedinukai	<i>Phyllotreta spp.</i> <i>Psylloides chrysocephala</i> <i>Meligethes aeneus</i>
Bulvės	0,07 - 0,10	Kolorado vabalai	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas: Insekticidas Fury yra zeta-cypermetrino alyva, pagaminta vandeninės emulsijos pagrindu. Fury - labai efektyvus, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas daugelio kenkėjų naikinimui žieminiuose javuose, miežiuose, rapsuose bei bulvėse. Fury yra kontaktinis insekticidas, jis veikia ir per virškinimo organus. Jis naikina čiulpiančius ir graužiančius kenkėjus. Fury gali būti purškiamas profilaktiškai arba pasirodžius kenkėjams. Norint gauti optimalų efektą, reikia gerai apipurkšti augalus. Naudojant didesnes normas, užtikrinama augalų apsauga ilgesniam laikotarpiui.

Žieminiai kviečiai ir vasariniai miežiai

Norma: 0,07 - 0,1 l/ha Fury nuo javinių tripsų, javinių amarų, lemų, spragių.

Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 42 dienos

Žieminiai kvietrugiai

Norma: 0,15 l/ha Fury nuo tripsų, amarų, lemų ir pjūklelių.

Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 42 dienos

Žieminiai ir vasariniai rapsai

Norma: 0,07 - 0,1 l/ha Fury nuo spragių ir rapsinių žiedinukų.

Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 42 dienos

Bulvės

Norma: 0,07-0,1 l/ha Fury nuo kolorado vabalų.

Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 7 dienos

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 300 l/ha. Nenaudokite mažesnio vandens kiekio, nei minimalus rekomenduojamas. Didžiausią rekomenduojamą vandens kiekį naudokite tankiuose pasėliuose, kad būtų užtikrintas tolygus padengimas.

Tirpalo paruošimas

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švariu vandeniu

ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Fury ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

Saugos priemonės

Dėvėkite neperšlampančius apsauginius drabužius, neperšlampančias, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės sudėties garų ir dujų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

Gaisro atveju

Fury yra degus. Saugoti nuo ugnies. Gaisro gesinimui naudoti putų, anglies dvideginio, ar sausų cheminių medžiagų gesintuvus. Degimo vietą izoliuoti. Evakuoti pavėju esančius žmones ir gyvulius. Dėvėti visus apsauginius drabužius ir dujokaukes. Nėkvėpuoti dūmų, garų ar rūko junginiais. Kenksmingi skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, vandenilio cianidas, chloras, vandenilio chloridas.

Sandėliavimas

Laikykite sandariai uždarytą saugioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės. Laikykite tik gamintojo taroje.

Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą vandeniu 3 kartus, supilkite išplovą į purkštuvu rezervuarą ir išpurškite ant dirbamos žemės. Preparato arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal vietinius reikalavimus.

Pastaba !

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

LV

Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūkļā minūtes. Rodoties kairinājumam, meklējiet palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdenī minūtes, konsultēties pie acu ārsta.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas traktā, nekavējoties izskalojiet muti un dzert ūdeni mēģinot izraisīt vemšanu. Ja nepieciešams, meklēt medicīnisko palīdzību. Ja cietušais ir bērns, meklēt medicīnisko palīdzību. Ja cietušais ir grūtniece, meklēt medicīnisko palīdzību. Ja cietušais ir bērns, meklēt medicīnisko palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas traktā, nekavējoties izskalojiet muti un dzert ūdeni mēģinot izraisīt vemšanu. Ja nepieciešams, meklēt medicīnisko palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas traktā, nekavējoties izskalojiet muti un dzert ūdeni mēģinot izraisīt vemšanu. Ja nepieciešams, meklēt medicīnisko palīdzību.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta palīdzība. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Informācija ārstam: Lietot simptomātisku ārstēšanu. Informācija ārstam: Lietot simptomātisku ārstēšanu. Informācija ārstam: Lietot simptomātisku ārstēšanu. Informācija ārstam: Lietot simptomātisku ārstēšanu.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 6000 0000

Iepakojuma likvidēšana:

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Iztukšošanas to nekavējoties izskalojiet ar ūdeni vismaz 3 reizes. Iztukšošanas to nekavējoties izskalojiet ar ūdeni vismaz 3 reizes. Iztukšošanas to nekavējoties izskalojiet ar ūdeni vismaz 3 reizes. Iztukšošanas to nekavējoties izskalojiet ar ūdeni vismaz 3 reizes.

© FMC Corporation reģistruots prekės ženklas -
©1 BASF reģistruots prekės ženklas

Lietošanas instrukcija**Fury®100 EW Fjuri 100 e.ū. Emulsija ūdenī****Darbīgā viela:** zeta-cipermetrīns 100 g/l.**Reģistrācijas numurs:** 0256 **Reģistrācijas klase 2.****Insekticīds kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešos un miežos, rudzos, tritikālē, auzās, ziemas un vasaras rapsī, zirņos, kartupeļos, cukurbietēs un kāpostos.****Preparāta apraksts:**

Fjuri ir piretroīdu grupas insekticīds, kas satur darbīgo vielu zeta-cipermetrīnu. Fjuri ir kontakta iedarbības insekticīds, kas raksturojas ar augstu efektivitāti pret lielāko daļu kaitēkļu ar grauzējtipa mutes orgāniem, kā arī pret kaitēkļiem ar sūcējtipa mutes orgāniem, ja nonāk saskarē ar tiem.

Lietošanas ieteikumi:

Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā	Nogaidīšanas laiks, dienas
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas	Labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), Laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>), Tripši (<i>Thysanoptera</i>), Kviešu vārpu pangodiņi (<i>Contarinia tritici</i> , <i>Sitodiplosis mosellana</i>)	0,1	2	42
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Psylloides chrysocephala</i>), Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0,1	2	42
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Laputis (<i>Aphidoidea</i>), Cikādes (<i>Cicadinea</i>)	0,1	2	7
Zirņi	Zirņu laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	0,07	2	7
Cukurbietes	Laputis (<i>Aphis fabae</i>), Tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0,1	2	7
Kāposti	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), Kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipeennis</i>), Kāpostu laputis (<i>Brevocoryne brassicae</i>)	0,1	2	7

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība):

Fjuri drīkst jaukt ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem. Šaubu gadījumā konsultēties ar preparāta izplatītāju.

Ieteicamais darba šķidruma daudzums:

Ūdens patēriņš 200 - 400 l/ha. Lielāko apjomu lieto, ja augiem ir bieža lapotne, lai vienmērīgi noklātu apstrādājamo virsmu.

Darba šķidruma sagatavošana:

Smidzinātājā iepilda 1/2 no paredzētā ūdens daudzuma, tad uzsāk maisīšanu un pievieno nepieciešamo Fjuri daudzumu, pēc tam pielej atlikušo ūdeni. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.

Maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem Fjuri bākā iepilda pēdējo.

Pēc Fjuri lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Šim nolūkam var lietot kalcinēto sodu 2 -4kg/100 l ūdens.

Bitēs:

Neapsmidzināt ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ziedoša rapša vai citu ziedošu kultūraugu apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām un jābeidz vienu stundu pirms ikdienas lidojuma sākuma. Nesmidzināt arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.

Drošības prasības personālam:

Izvaieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai uz apģērba. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, cieši pieguļošas aizsargbrilles, P2 vai FFP2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, 149; ķīmiski necaurļaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Darba apģērbus glabāt atsevišķi.

Vides aizsardzības prasības:

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīlpu un ūdens teču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietvertu likumu prasības un rekomendācijas.

Uzglabāšana:

Glabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā sausā, aizslēdzamā, labi vēdināmā un no sala pasargātā noliktavā,

temperatūrā no 0° līdz +40°C. Izvairoties no aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt!

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.**Ievērojiet!**

Daudziem insekticīdiem pastāv rezistences izveidošanās iespēja. Rezistences veidošanās var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro ieteiktās preparāta devas.

Juridiskā atbildība:

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantējam tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

® = reģistrēta FMC tirdzniecības zīme

Repeat of cover lab