

Opus®

Sisiteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių ir kvietrugių bei cukrinių runkelių apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

Registracijos numeris:	0214F/06
Veiklioji medžiaga:	epoksikonazolas 125 g/l
Produkto forma:	koncentruota suspensija
Pakuotė:	5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Į Opus sudėtį įeina viena veiklioji medžiaga - epoksikonazolas. Tai labai efektyvus sisteminis fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu gydomuoju veikimu prieš visas lapų ir varpų ligas javuose ir prieš labiausiai paplitusias lapų ligas cukriniuose runkeluose.

Epoksikonazolas priklauso triazolų gupės veikliosioms medžiagoms, kurių pagrindinis veikimas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelių membranos suardymas.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, tikroji miltligė	0,5 - 1,0	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo paskutinio lapo pasirodymo iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 45-59). Jeistipriai plinta miltligė, pridėkite Flexity arba Corbel®1. Kviečius paprastai reikia purkšti du kartus. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos Didžiausias purškimų skaičius – 1
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė	1,0	1,0 l/ha Opus purškiamas bambklėjimo pabaigoje – plaukėjimo viduryje (BBCH 37 - 55). Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos Didžiausias purškimų skaičius – 1

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, fomozė, rūdys	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0 l/ha Opus purškiamas liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje, radus 5 ligotus iš 100 apžiūrėtų lapų (10-yje skirtingų lauko vietų patikrinama po 10 senesnių lapų). Purškama 2 kartus po 0,5 l/ha arba stipriai plintant ligoms vieną kartą, naudojant maksimalią 1,0 l/ha normą. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos Didžiausias purškimų skaičius – 2

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse, kai ligos plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose, kai ligos plinta silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo intensyvumo bei oro sąlygų.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švari vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Opus ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams vartokite tik švarų vandenį.

MAIŠYMAS

Opus gali būti maišomas su augimo regulatoriais Cycocel, Medax Top, Terpal, insekticidais Fastac, Fury, su daugeliu plačiai naudojamų fungicidų ir herbicidų, skystomis trąšomis Solubor. Opus taip pat galima maišyti su mangano (Mn) turinčiais produktais.

PURŠKIMAS

Kad purškimas prieš ligas būtų efektyvus, labai svarbu purškiant nemažinti rekomenduojamo vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus.

Vandens kiekis - 200 - 300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 2 val.