


# Pictor® Active

## FUNGICIDAS

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*) ir juodosios dėmėtligės (*Alternaria brassicae*), pupų apsaugai nuo pilkojo (kekerinio) puvinio (*Botrytis cinerea*), rudosios (šokoladinės) dėmėtligės (*Botrytis fabae*), rūdžių (*Uromyces viciae-fabae*), žirnių apsaugai nuo pilkojo (kekerinio) puvinio (*Botrytis cinerea*) ir rūdžių (*Uromyces viciae-fabae*).

Žieminių ir vasarinių rapsukų, baltųjų ir juodųjų garstyčių, pluoštinių ir sėmeninių linų, daržinių aguonų, aliejinių ridikų apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*), baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*), alternariozės (*Alternaria spp.*), netikrosios miltligės (*Hyaloperonospora parasitica*) Pictor Active registruotas pagal EP ir ET Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



# 5 L

© = BASF registruotas prekės ženklas

81146176 LT 2090



## VEIKIMO BŪDAS

*Pictor Active* yra sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, pupų ir žirnių, žieminių ir vasarinių rapsukų, baltųjų ir juodųjų garstyčių, pluoštinių ir sėmeninių linų, daržinių aguonų, aliejinių ridikų apsaugai nuo grybinių ligų. *Pictor Active* sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: boskalido ir piraklostrobino.

**Boskalidas** priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei. Boskalidas blokuoja patogeninių grybų augimą, sustabdydamas energetinių resursų gamybą ir taip neleidamas vykti kitų svarbių ląstelių dalių cheminei sistizei. Boskalidas augale juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t. y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šių savybių apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys.

**Piraklostrobinas** yra strobilurinių grupės veiklioji medžiaga, turinti apsauginį ir gydomąjį veikimą. Biocheminis strobilurinių veikimo būdas yra mitochondrinio kvėpavimo slopinimas. Taip užkertamas kelias grybų sporų dygimui, micelio augimui ir visam infekcijos vystymuisi. Piraklostrobinas turi sisteminį ir translaminarinį veikimą. Veiklioji medžiaga gali prasiskverbti į lapų paviršius, ir taip slopinti grybo augimą augalų audiniuose.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

### AUGALAI IR LIGOS

#### Žieminiai ir vasariniai rapsai

*Pictor Active* žieminius ir vasarinius rapsus apsaugo nuo:

Baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Juodosios dėmėtligės (*Alternaria brassicae*)

**Norma:** 0,6 – 1,0 l/ha.

Kai sąlygos ligoms plisti nėra labai palankios, naudokite mažesnę rekomenduojamą normą. Purškti galima ir du kartus (pvz.: 2 x 0,5 l/ha), 7 – 21 dienos intervalu, tačiau bendra naudojama norma neturi viršyti 1,0 l/ha.

Didžiausias purškimo skaičius: 2, neviršijant didžiausios produkto normos – 1,0 l/ha augalams per augimo sezoną.

#### Purškimo laikas:

*Pictor Active* purškiamas rapsų žydėjimo metu (BBCH 60 – 69). Purškiant nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*), tinkamiausiais laikais naudoti fungicidą – žydėjimo vidurys (BBCH 63 – 65).

Purškiant nuo juodosios dėmėtligės (*Alternaria brassicae*), svarbiausia apsaugoti ankštaras nuo infekcijos ir pirmalaikio atsidarymo. Tinkamiausias purškimo laikas yra žydėjimo pabaiga, prieš pradeda formuotis pirmosioms ankštaroms (BBCH 69).

*Pictor Active* purškiamas žydėjimo metu mažina ir fozozės bei netikrosios miltligės pasireiškimą.

#### Pupos

*Pictor Active* pupas apsaugo nuo:

Rūdžių (*Uromyces viciae-fabae*)

Rudosios (šokoladinės) dėmėtligės (*Botrytis fabae*)

Iš dalies nuo Kečerinio (pilkojo) puvinio (*Botrytis cinerea*)

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti galima ir du kartus (pvz.: 2 x 0,5 l/ha), 14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimo skaičius: 2, neviršijant didžiausios produkto normos – 1,0 l/ha augalams per augimo sezoną.

### **Purškimo laikas:**

Pictor Active purškiamas nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matoni pirmi butonai iki 50 procentų ankščių pasiekus būdingą ilgį (BBCH 51 – 75).

### **Žirniai grūdams**

Pictor Active žirnius apsaugo nuo:

Rūdžių (*Uromyces viciae-fabae*)

Iš dalies nuo Kečerinio (pilkojo) puvinio (*Botrytis cinerea*)

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti galima ir du kartus (pvz.: 2 x 0,5 l/ha), 14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimo skaičius: 2, neviršijant didžiausios produkto normos – 1,0 l/ha augalams per augimo sezoną.

### **Purškimo laikas:**

Pictor Active purškiamas nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matoni pirmi butonai iki 50 procentų ankščių pasiekus būdingą ilgį (BBCH 51 – 75).

Augalai	Augalų tarpsnis	Norma l/ha	Purški-mų skaičius	Tarpai tarp purškimų	Vandens kiekis	Pastabos
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 60 – 69)	0,6 – 1,0	2	7 – 21 diena	100 – 400 l/ha (rekomenduojama ne mažiau kaip 200 l/ha)	Purškiant 2 kartus neviršyti didžiausios leistinos normos – 1,0 l/ha
Pupos ir žirniai grūdams	Nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matoni pirmi butonai iki 50 proc. ankščių pasiekus būdingą ilgį (BBCH 51 – 75)	1,0 arba 0,5 + 0,5	2	14 dienų	200 – 300 l/ha	Purškiant 2 kartus neviršyti didžiausios leistinos normos – 1,0 l/ha

### **Mažos apimties naudojimai**

*Pictor Active* yra registruotas naudojimui mažais plotais auginamuose augaluose vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį mažais plotais auginamiems augalams prisiima produkto naudotojas.

## Mažais plotais auginami augalai

Augalai	Augalų tarpsnis	Norma l/ha	Purškimų skaičius	Tarpai tarp purškimų	Vandens kiekis	Pastabos
Žieminiai ir vasariniai rapsiukai, baltosios ir juodosios garstyčios, pluoštiniai ir sėmeniniai linai, daržinės aguonos, aliejiniai ridikai	Nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 60 – 69)	0,6 – 1,0	2	7 – 21 diena	150 – 400 l/ha (rekomenduojama ne mažiau kaip 200 l/ha)	Purškiant 2 kartus, neviršyti didžiausios leistinos normos – 1,0 l/ha

### **Pictor Active žieminius ir vasarinius rapsukus, baltąsias ir juodąsias garstyčias, daržines aguonas, aliejinius ridikus saugo nuo:**

Baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Alternariozės (*Alternaria spp.*)

Netikrosios miltligės (*Hyaloperonospora parasitica*)

*Pictor Active* purškiamas žydėjimo metu mažina fomezės (*Phoma linicola*) bei alternariozės (*Alternaria linicola*) pasireiškimą linuose.

### **Dėmesio!**

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkintojus, nepurkšti *Pictor Active* augalų žydėjimo metu (BBCH 60 – 69) nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

*Pictor Active* sudėtyje yra dvi skirtingą veikimo būdą turinčios veikliosios medžiagos – boskalisas ir piraklostrobinas. Boskalisas yra sukcinatų dehidrogenazės inhibitorius (SDHI), kuris slopindamas energijos gamybą ir svarbių ląstelių komponentų sintezę sutrikdo patogeninių grybų augimą (FRAC kodas C2). Piraklostrobinas priklauso strobilurinių grupei (FRAC kodas C3). Strobiluriniai slopindami mitochondrinį kvėpavimą stabdo grybų sporų dygimą ir micelio augimą.

Visiems C2 ir C3 grupėms priklausantiems fungicidams būdingas kryžminis atsparumas. Kryžminio atsparumo tarp C2 ir C3 grupėms priklausančių fungicidų nėra.

Baltojo (sklerotinio) puvinio ir juodosios dėmėtingės sukėlėjų atsparumo išsivystymo rizika yra vertinama kaip vidutinė, kekerinio (pilkojo) puvinio – kaip didelė. Siekiant

sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, *Pictor Active* būtina naudoti laikantis šių rekomendacijų:

- fungicidą purškite profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Venkite gydomųjų purškimų;
- naudokite rekomenduojamas fungicido normas ir nurodytu augalų augimo tarpsniu;
- to paties sezono metu fungicidą naudokite ne daugiau kaip 2 kartus.

Fungicidų naudojimas nepanaikina būtinybės sėti ligoms atsparias veisles, taikyti sėjomainą, naudoti sveiką sėklinę medžiagą ir laikytis geros žemės ūkio praktikos.

Naujausias rekomendacijas, kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje: [www.frac.info](http://www.frac.info).

## VANDENS KIEKIS

Vandens kiekis gali būti 100 – 400 l/ha, tačiau, norint užtikrinti kokybišką augalų padengimą ir patekimą į augalus, naudokite ne mažiau kaip 200 l/ha.

## TIRPALO PARUOŠIMAS

Iki pusės užpildykite purkštuvu talpą švariu vandeniu ir pradėkite maišyti. Prieš naudojimą gerai supurtykite pakuotę ir įpilkite reikiamą produkto kiekį. Gerai išskalaukite tuščias produkto pakuotes ir paplavas supilkite į purkštuvu talpą. Įpilkite likusį vandenį ir tęskite maišymą, kol baigsite purkšti. Prieš ruošiantis naudoti mišinius rezervuare, kiekvieną produktą pilkite atskirai, atsižvelgiant į nurodymus dėl maišymo eiliškumo.

## PURŠKIMAS

*Pictor Active* galima naudoti su visų rūšių purkštuvais. Visada naudokite tik gerai išplautą purkštuvą. Reikalui esant, naudokite plovimo priemones.

Produkto pakuotę gerai suplakite, pripilkite į purkštuvą  $\frac{1}{2}$  –  $\frac{3}{4}$  vandens. Įjunkite maišymą. Įpilkite reikiamą kiekį produkto. Papildykite trūkstantu vandens kiekiu.

Maišyklę laikykite įjungtą viso purškimo metu. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

**Atsparumas lietuvi:** Po purškimo *Pictor Active* turėtų nelyti 1 – 2 valandas.

## MAIŠYMAS SU KITAIŠ PRODUKTAIS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgąs kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio

ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>). Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

**Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgą kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>).

**Siekiant apsaugoti pašalinius žmones ir gyventojus** operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams inspektuojant purkštus augalus, būtina dėvėti ilgąs kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukąs nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvą kruopščiai išplaukite tiek prieš, tiek po purškimo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai pakenkti augalams.

## SANDĖLIAVIMAS

Laikykite sandariai uždarytą saugioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės. Saugokite nuo elektrostatiinių iškrovų. Venkite dulkių susidarymo. Laikykite tik gamintojo pakuotėje temperatūroje nuo 0 iki + 30 °C. Laikant uždarytą originalioje pakuotėje, laikymo trukmė – 24 mėnesiai.

## **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

## **GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

# Pictor® Active

## FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos boskaldidas 150 g/l (13,1 %)  
piraklostrobinas 250 g/l (21,9 %)

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

### ATSARGIAI

Dirgina odą.

Kenksmingas įkvėpus.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR  
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekęsįsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą**  
telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

**Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112**

**Avarijos atveju kreiptis bendroju pagalbos telefonu: 112**

**Registracijos numeris: AS2-8F(2019)**

**Siuntos numeris:** žiūrėkite ant pakuotės

**Pagaminimo data:** žiūrėkite ant pakuotės

**Galiojimo laikas:** 2 metai nuo pagaminimo datos

**Laikymas:** Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +30 °C.

**Užregistravo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva**

**Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija**

**Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1,**

**LT-05132 Vilnius, Lietuva, Telefonas: +370 5 2107450**

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ  
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

® = BASF registruotas prekės ženklas



81146177 LT 2090

5 L



4 04 1885 106476