


Tango® Flex

FUNGICIDAS

Sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių bei žieminių ir vasarinių miežių, avižų pasėliuose nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui

5 L



VEIKIMO BŪDAS

Tango Flex SC yra sisteminis fungicidas, kurio dvi veikliosios medžiagos turi apsauginį, gydomąjį ir naikinamąjį poveikį nuo grybinių ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietručiuose, žieminiuose rugiuose bei žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, avižose.

Veiklioji medžiaga **epoksikonazolas** priklauso triazolų grupės fungicidams. Jis gerai ir ilgam apsaugo nuo visų svarbiausių ligų, tokių kaip septoriozės, kviečių dryžligės, rinchosporiozės, dryžligių, rūdžių.

Kita Tango Flex SC veiklioji medžiaga – **metrafenonas** – priklauso naujausiai cheminei grupei – benzofenonams. Metrafenonas pasižymi unikaliu veikimo būdu. Jis turi apsauginį, gydomąjį ir antisporeliacinį poveikį nuo miltligės, be to iš dalies veiksmingas ir nuo stiebalūžės.

Panaudojus Tango Flex SC javai apsaugomi nuo ligų 4 – 6 savaites, priklausomai nuo augimo sąlygų ir ligų plitimo intensyvumo. Po nupurškimo fungicidas patenka į augalą, kai tik tirpalas nudžiūna nuo lapų paviršiaus. Po valandos užėjęs lietus neturi jokios neigiamos įtakos fungicido veiksmingumui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Ligos

Kviečių dryžligė	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>
Lapų septoriozė	<i>Mycosphaerella graminicola</i> (<i>Septoria tritici</i>)
Miltligė	<i>Blumeria graminis</i>
Rudosios rūdys	<i>Puccinia recondita</i>
Geltonosios rūdys	<i>Puccinia striiformis</i>
Stiebalūžė*	<i>Oculimacula spp.</i>

Purškimo laikas

Purškiama nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69).

Norma: 1,5 l/ha Tango Flex SC. Purkšti jautresnius ligoms veislių kviečius ar intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Pasėliai purškiami vieną kartą, pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.

* Nuo stiebalūžės purškiama 1,5 l/ha Tango Flex SC bamlėjimo pradžioje (BBCH 30 – 32).

Norma: 0,75 l/ha Tango Flex SC, kai fungicidais planuojama purkšti du kartus. Antram purškimui galima pasirinkti Tango Flex SC 0,75 l/ha arba kitą fungicidą.

Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.

Purkšti mažiau jautrių ligoms veislių kviečius ar esant mažiau palankioms ligų plitimui sąlygoms.

Didžiausias purškimų skaičius, purškiant po 0,75 l/ha – 2.

Purškiant po 1,5 l/ha, didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Ligos

Tinkliškoji dryžligė	<i>Pyrenophora teres</i>
Miltligė	<i>Blumeria graminis</i>
Rinchosporiozė	<i>Rhynchosporium secalis</i>
Smulkiosios rūdys	<i>Puccinia hordei</i>

Purškimo laikas

Purškiama nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69).

Norma: 1,5 l/ha Tango Flex SC pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams arba profilaktiškai. Purkšti jautresnių ligoms veislių miežius ar intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

Norma: 0,75 l/ha Tango Flex SC. Mažesnę normą pasirinkite, kai fungicidais purškiate du kartus arba mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose, esant mažiau palankioms sąlygoms ligoms plisti.

Didžiausias purškimų skaičius, purškiant po 0,75 l/ha – 2.

Purškiant po 1,5 l/ha, didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Ligos

Lapų septoriozė	<i>Mycosphaerella graminicola</i>
Miltligė	<i>Blumeria graminis</i>
Rudosios rūdys	<i>Puccinia recondita</i>
Geltonosios rūdys	<i>Puccinia striiformis</i>
Kviečių dryžligė	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>
Stiebalūžė*	<i>Oculimacula spp.</i>

Purškimo laikas

Purškiama nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).

Norma: 1,5 l/ha Tango Flex SC. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai.

* Nuo stiebalūžės purškiama Tango Flex SC bamlėjimo pradžioje (BBCH 30-32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai rugiai Ligos

Miltligė	<i>Blumeria graminis</i>
Rinchosporiozė	<i>Rhynchosporium spp.</i>
Rudosis rūdys	<i>Puccinia recondita</i>
Stiebalūžė*	<i>Oculimacula spp.</i>

Purškimo laikas

Purškiama nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69).

Norma: 1,5 l/ha Tango Flex SC. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai.

* Nuo stiebalūžės purškiama Tango Flex SC bamlėjimo pradžioje (BBCH 30 – 32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Avižos Ligos

Miltligė	<i>Blumeria graminis</i>
Vainikuotosios rūdys	<i>Puccinia coronata</i>

Purškimo laikas

Purškiama nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69).

Norma: 1,5 l/ha Tango Flex SC. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Tango Flex SC veikliosios medžiagos epoksikonazolas priklauso triazolų grupei (FRAC kodas G1), o metrafenonas – benzofenonams (FRAC kodas U8). Yra tikimybė, kad naudojant fungicidą Tango Flex SC gali išsivystyti atsparios grybų rasės, todėl gali sumažėti šio produkto veiksmingumas. Purškite Tango Flex SC, kai tik pasirodo pirmieji ligos požymiai. Purškite ne daugiau kaip 2 kartus per sezoną. Naudokite Tango Flex SC laiku ir nuo konkrečių ligų, pagal rekomendacijas, pateiktas etiketėje. Tango Flex SC sudėtyje yra dvi skirtingo poveikio veikliosios medžiagos iš skirtingų cheminių grupių, todėl sumažėja rizika atsparumui vystytis.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas minimalus vandens kiekis 200 l/ha. Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose 300 – 400 l/ ha.

Pastaba: Fungicidas gali turėti poveikį šalia augančioms dviskilčių augalų rūšims.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Prieš atidarydami talpą su Tango Flex SC, suplakite. Įpilkite reikiamą kiekį Tango Flex SC ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Paruoštą mišinį iš karto išpurškite.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0.4 mm), chloropreno (0.5 mm), butilo (0.7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į fungicidu Tango Flex SC apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, ir sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsisivelkant. Susitęsęs pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite saugiai užrakintą, sausoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje, temperatūroje nuo 0° iki +30 °C. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite gerai uždarytą, originalioje pakuotėje, ne ilgiau kaip 2 metus.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalį. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

Tango® Flex

FUNGICIDAS

Sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių bei žieminių ir vasarinių miežių, avių pasėliuose nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui

Veikliosios medžiagos epoksikonazolas 83 g/l (7.7%)

metrafenonas 100 g/l (9.3%)

Cheminės grupės: triazolas ir benzofenonas

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

PAVOJINGAS

Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina

vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jei numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekęsias medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.

Apsinuodijimų kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą

telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112

Registracijos numeris: AS2-13F(2019)

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo

Laikymas: Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +40 °C

Užregistravo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva

Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva,

Telefonas: +370 5 2107450

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

® = BASF registruotas prekės ženklas



81138028 LT 1109

5 L