

Revystar® XL

FUNGICIDAS

Revystar XL yra sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo lapų ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose ir avižose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

PRISIJUNK PRIE
REVYLIUCIJOS



5 L

® = BASF registruotas prekės ženklas



8118 1657 LT 2045

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėi.

VEIKIMO BŪDAS

Revystar XL sisteminio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinų kviečių, žieminių ir vasarinų miežių, žieminių ir vasarinų kvietrugiu, žieminių rugių ir avižų, cukrinių ir pašarinių runkelių apsaugai nuo grybinių lapų ligų. *Revystar XL* turi apsauginį ir gydomajį poveikį.

Revystar XL yra sudarytas iš 2 veiklių medžiagų: mefenetriflukonazolo ir fluksapiroksado. Abi veiklosios medžiagos yra sisteminės.

Mefenetriflukonazolas priklauso triazolų cheminės grupės fungicidams. Pagal veikimo būdą tai -demetilinimo inhibitorius (DMI). Jis blokuoja ergosterolio biosintezę ir tokiu būdu sustabdą grybo ląstelės membranos augimą. Mefenetriflukonazolas yra veiksmingas nuo daugelio javų grybinių ligų įvairiausiuose jų augimo tarpsniuose, tiek ant lapų paviršiaus, tiek lapų viduje. Veiklioji medžiaga, patekusi ant augalo lapų paviršiaus, labai greitai absorbuojama ir lėtai vandens įndais pernešama į viršutines augalo dalis. Šis lėtas sisteminis judėjimas leidžia susidaryti vidiniams veiklosios medžiagos rezervuarams, iš kurių ji pasiskirsto ir užtikrina ilgalaikį veikimą.

Fluksapiroksadas priklauso pirazolo karboksamidų cheminės grupės fungicidams. Jis stabdo baltymo sukcinato dehidrogenazės (SDH) susidarymą, neleisdamas gamintis energijai ir taip stabdydamas kitų svarbių ląstelės dalių cheminę sintezę. Patekës ant lapo paviršiaus, fluksapiroksadas vaškiniaiame sluoksnyje greitai suformuoja veiklosios medžiagos rezervuarus, iš kurių laipsniškai išsišikria ir juda akropetaliai. Laipsniškas išsišyrimas užtikrina pastovų ir ilgalaikį jo tiekimą ir apsaugą ant naujai išaugančių augalo dalių.

Javuose *Revystar XL* galima naudoti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69). Geriausią rezultatą pasieksite purkšdami profilaktiškai, dar prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams. Norint gerai apsaugoti nuo geltonųjų rūdžių, purkštį reikia iš karto pastebėjus pirmuosius ligos požymius.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Revystar XL pasižymi labai geru veikimu nuo daugelio javų ligų:

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Lapų septoriozė (*Zymoseptoria tritici*)

Kviečių dryžligė (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Geltonosios rūdys (*Puccinia striiformis*)

Rudosios rūdys (*Puccinia triticina*)

Miltligė (*Blumeria graminis*)

Norma: Revystar XL 0,75 – 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kviečiuose, ypač kai plinta kviečių dryžligė ir geltonosios rūdys ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du ar tris kartus.

Geriausiai Revystar XL veikia, kai purškiamas du kartus po 0,75 l/ha, bamblėjimo pradžioje (BBCH 30 – 32) ir pasirodžius paskutiniams lapui – plaukėjimo viduryje (BBCH 39 – 55) po 14 – 21 dienos.

Purškiamas 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.

Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiamas BBCH 30-49 – 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiamas po BBCH 49 – 21 diena.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Lapų septoriozė (*Zymoseptoria tritici*)

Kviečių dryžligė (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Geltonosios rūdys (*Puccinia striiformis*)

Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*)

Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*)

Miltligė (*Blumeria graminis*)

Norma: Revystar XL 0,75 – 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kvietrujiuose, ypač kai plinta kviečių dryžligė ir geltonosios rūdys ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kvietrujiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du ar tris kartus.

Geriausiai Revystar XL veikia, kai purškiamas du kartus po 0,75 l/ha, bamblėjimo pradžioje (BBCH 30 – 32) ir pasirodžius paskutiniams lapui – plaukėjimo viduryje (BBCH 39 – 55) po 14 – 21 dienos.

Purškiamas 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.

Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiamas BBCH 30-49 – 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiamas po BBCH 49 – 21 diena.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Tinkliškoji dryžligė (*Pyrenophora teres*)

Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*)

Ramularija (*Ramularia collo-cygni*)

Smulkiosios rūdys (*Puccinia hordei*)
Miltligė (*Blumeria graminis*)

Norma: Revystar XL 0,75 – 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus.

Purškiama 1 arba 2 kartus, neviršijant 1,5 l/ha per sezoną.
Mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama BBCH 30-49 – 14 dienų,
mažiausias intervalas tarp 2 purškimų, kai pirmą kartą purškiama po BBCH 49 – 21 diena.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai rugiai

Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*)

Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*)

Miltligė (*Blumeria graminis*)

Norma: Revystar XL 0,75 – 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių rugiuose, kai stipriai plinta rinchosporiozė ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių rugiuose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus.

Purškiama 1 kartą per sezoną.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Avižos

Avižų dryžligė (*Pyrenophora avenae*)

Norma: Revystar XL 0,75 – 1,5 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių avižose, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių avižose, kai pasėliai sezono metu fungicidais purškiami du kartus.

Purškiama 1 kartą per sezoną.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Cukriniai ir pašariniai runkeliai

Baltuliai (*Ramularia beticola*)

Miltligė (*Erysiphe betaе*)

Rūdys (*Uromyces betaе*)

Rudmargė (*Cercospora beticola*)

Norma: *Revystar XL* 0,7-1,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, purškiamą, kai lapai dengia 90 % tarpueilių iki runkeliai pasieka techninę brandą (BBCH 39-49). Didesnė norma naudojama kai plinta rudmarge.

Purškimą kartokite po 14 dienų, arba vėliau, kai vėl pradeda plisti ligos. Dukartinis purškimas leidžia apsaugoti runkelius nuo lapų ligų ilgesnį laiką.

Purškiamą 2 kartus per sezona.

Minimalus laikotarpis tarp puškymų – 14 dienų.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Revystar XL yra sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų, turinčių skirtingą veikimo būdą. **Mefentriflukonazolas** priskiriamas DMI fungicidų grupei (FRAC kodas 3). Šios grupės veiklioms medžiagoms būdinga vidutinė atsparumo atsiradimo rizika. Jau yra nustatyta, kad lapų septoriozė (*Zymoseptoria tritici*) tampa atspari kai kuriems šios grupės fungicidams ir tai gali smarkiai paveikti produkto veiksmingumą nuo šios ligos. Mefentriflukonazolas yra labai veiksminga net nuo atsparių lapų septoriozės padermių atmainų.

Fluksapiroksadas priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC kodas 7). SDHI fungicidams būdinga vidutinė – didelė atsparumo atsiradimo rizika.

Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, *Revystar XL* naudokite tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Venkite gydomujų purškimų. Taikykite visas geros žemės ūkio praktikos priemones, kurios sumažina ligų tikimybę (sėjomaina, arimas, optimalus sėjos laikas) ir plitimą (optimalus pasėlio tankumas, trėšimas). Nenaudokite *Revystar XL* daugiau kaip 2 kartus.

Naujausias rekomendacijas, kaip išvengti atsparumo išsivystymo, galite rasti tinklapje: www.frac.info arba dėl informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis javams yra 100-300 l/ha, runkeliams – 100-400 l/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšt. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo turį ir produkto kiekį. Puse purkštovo rezervuaro užpildykyte švariu vandeniu ir įjunkite maišykę. Produkto PAKUOTĘ GERAI SUPLAKITE. Įpilkite reikiamą kiekį *Revystar XL* ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukelių metu maišytuvas turi būti įjungtas. Kai naudojate produkty mišinius, atidžiai perskaitykite visų produktų etiketes ir kiekvieną produktą pilkite atskirai į purkštovo rezervuarą, gerai išmaišykite.

PURŠKIMAS

Praėjus 0,5 – 1 valandai po purškimo lietus neturj įtakos Revystar XL veiksmingumui.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produkту ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $> 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas $> 200 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą aivalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Stengtis neįkvėpti ruko, garu, aerozolio. Esant pavojuj jų įkvėpti, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriais lauko purkštuais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $> 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas $> 200 \text{ g/m}^2$), avėti sandarią aivalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Pašaliniai žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamujų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į javų apdorotus plotus, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus bei būtina mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produkту. Stengtis neįkvėpti ruko, garu ir dulksnos. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbtį prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei nejmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

MAIŠYMAS SU KITAIMS PRODUKTAIS

Revystar XL mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

PRODUKTO LAIKYMAS

Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo žemesnių kaip 0 °C temperatūrų. Saugokite nuo aukštesnės kaip +30 °C temperatūros. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių saulės spinduliu. Laikykite tik gamintojo pakuotėje.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantčiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinges dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

Revystar® XL

FUNGICIDAS

Revystar XL yra sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo lapų ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose ir avižose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



5 L

Revystar® XL

FUNGICIDAS

Veiklosios medžiagos: mefenetriflukonazolas 100 g/l (10,0 %)
fluksapiroksadas 50 g/l (5,0 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)

ATSARGIAI

Sudėtyje yra mefenetriflukonazolo ir polimero (2-propeno rūgštės, 2-metilo polimero su tert-Bu akriлатu, Me metakriлатu, polietilenglikolo metakrilato C16-18-alkilo eterais.)

Kenksminga prarūs.

Kenksminga jkvėpus.

Dirgina oda.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirgti kvepavimo takus.

Gali pakankti žindomam vaikui.

Toksiski vandenims organizmams, sukelia ligalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ar aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuodrumus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Nejvkvepti rūko, garu, aerosolio.

Vengti kontaktu nėštumu metu ir maitinančių krūtimi.

Po naudojimo krauopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.

Mūvėti apsaugines pirtinėles, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą / kreiptis į gydytoją

Esant poreikiui arba jeigu numanomas paveikslas: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbtį prieš vėl juos apsilankant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Laikyti gerai vėdinamoja vietoje. Taipkykl laikyti sandariai uždaryta.

Laikyti užrakināta.

Taipkykl šalinti pagal nacionalinės teisės aktu reikalavimus.

Neuzterstti vandenys augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkiniių ir melioracijos grioviu.

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112

Registracijos numeris: AS2-98F(2019)

Siuntos numeris: Žiūrėkite ant pakuočės

Pagaminimo data: Žiūrėkite ant pakuočės

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos

Laikymas: Laikomasis temperatūroje nuo 0 iki +30 °C.

Užregistruavo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva

Gamintojas: Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch,

8808 Pfäffikon SZ, Šveicarija

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTA ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

© = BASF registruotas prekės ženklas

UFI : 1TDM-E4PR-U00R-PEPT



5 L

81181658 LT 2045