

Scala®

Kontaktinio ir lokaliai sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas nuo rauplių obelyse, kriaušėse ir pilkojo kekerinio puvinio braškėse, auginamose atviraime grunte arba po danga.



FUNGICIDAS



Veiklioji medžiaga:
pirimetanilas 400 g/l



Produkto forma
koncentruota suspensija (SC)



Pakuotė
5 l



VEIKIMO BŪDAS

SCALA veikia kaip apsauginis ir lokaliai sisteminis fungicidas, sutrikdantis grybinių ligų fermentinę sistemą. Veiklioji medžiaga pirimetanilas priklauso anilinopirimidinių grupei, blokuojančiai fermentų vystymąsi, dėl kurio sustoja parazitinių grybų augimas.

SCALA labiausiai tinka ankstyviesiems purškimams, nes gerai veikia net esant žemai temperatūrai, pradedant nuo +5 °C.

Braškės nuo pilkojo kekerinio puvinio paprastai purškiamos žydėjimo metu. SCALA braškėse naudojamas vieną kartą, kai planuojami 2–3 purškimai nuo pilkojo kekerinio puvinio. Jei planuojami 4–6 purškimai nuo pilkojo puvinio, SCALA naudojamas 2 kartus, tačiau purškiama ne 2 kartus iš eilės, o kaitaliojant su kitais fungicidais.

Rekomenduojama fungicidą SCALA naudoti mišinyje su DELAN PRO.

AUGALAI IR LIGOS

Šis mišinys užtikrina dvigubą apsaugą nuo obelių ir kriausių rauplių.

Augalai	Ligos	Norma, l/ha	Naudojimas
Obelys ir kriaušės	Obelių ir kriausių rauplės.	1,1	Nuo „žaliojo kūgio“ tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 53–69).
		0,75	Vėlesnieji tarpsniai po žydėjimo, nuo vaisiaus padidėjimo iki 10 mm iki vaisius pasiekia apie 70 % būdingo dydžio (BBCH 71–77). Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos. Didžiausias purškimų skaičius – 4. Purškama 7–10 dienų intervalais.
Braškės atvirame grunte arba po danga	Pilkasis kekerinis puvinys.	1,5–2,0	Nuo žydėjimo pradžios iki vaisiaus brandos, antrasis derlius: dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 60–89). Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 3 dienos. Didžiausias purškimų skaičius – 2. Purškama 7–14 dienų intervalais.

DĖMESIO!

- Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val.
- Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
- Purškimų nuo ligų dažnumas priklauso nuo ligų išsivystymo ir augalų augimo intensyvumo, bet paprastai apsauginis poveikis trunka 7 dienas. Gydomasis poveikis paprastai trunka 2–3 dienas, vėsesniu oru – šiek tiek ilgiau.

MAIŠYMAS

Galima maišyti su DELAN PRO.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams – 200–400 l/ha, sodams – iki 1000 l/ha. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštiesiems medžiams naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį SCALA ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purškite.