

# Conaxis®

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti visų rūšių žirnių, pupų, sojų, vasarinių ir žieminių rapsų laukuose po sėjos iki augalų sudygimo.



## HERBICIDAS



Veikliosios medžiagos:  
dimetenamidas-P 400 g/l  
klomazonas 50 g/l



Produkto forma  
kapsulių suspensija (CS)



Pakuotė  
5,0 l, 10 l



## VEIKIMO BŪDAS

CONAXIS sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: dimetenamido-P ir klomazono.

**Dimetenamidas-P** patenka į piktžolės per šaknis ir dygstančius daigus (hipokotilius/epikotilius) ir sutrikdo ilgos riebalų rūgščių grandinės gamybą. Jis slopina ląstelių dalijimąsi, paveiktos piktžolės iš karto nustoja augti, o po to sunyksta visiškai.

**Klomazonas** taip pat patenka į piktžolės per šaknis bei dygstančius daigus ir slopina baltymus, kurie yra atsakingi už chlorofilo ir karotinoidų biosintezę.

CONAXIS yra sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, į piktžolės patenkantis per šaknis, daigus ir skilčialapius. Jautrios piktžolės dar gali ir sudygti, bet sudygsta pabalsios ir labai greitai žūva.

Geriausiai CONAXIS veikia, panaudojus jį iš karto po sėjos ant gerai paruoštos, drėgnos, išlygintos ir įdirbtos dirvos. Geras, vienodas dirvos paruošimas, tolygiai, optimaliu gyliu įterpta sėkla, geras šiaudų įterpimas taip pat svarbus, kad herbicidas galėtų tolygiai pasklisti dirvos paviršiuje. Jei purškimo metu dirva sausa, herbicidas pradės veikti tik po lietaus.

Purkšti reikia iš karto po sėjos – prieš augalų sudygimą. Šiltoje ir drėgnoje dirvoje, pavyzdžiui, rapsų dygimas po sėjos gali prasidėti jau po 3 dienų. Labai svarbu, kad sėklos būtų įterptos kuo tolygiau, ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Žirniai, pupos ir sojos dygsta ilgiau.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

CONAXIS galima naudoti žirniuose, pupose, sojose, taip pat žieminiuose ir vasariniuose rapsuose. Herbicidas geriausiai veiks paskleistas ant gerai išdirbtos, drėgnos, lygios dirvos.

Augalai	Norma l/ha	Panaudojimo laikas	Pastabos
Žirniai, pupos, sojos	1,0–1,4	Po sėjos iki sudygimo BBCH (00-09)	Purškiama pavasarį 1 kartą
Vasariniai rapsai	1,25	Po sėjos iki sudygimo BBCH (00-09)	Purškiama pavasarį 1 kartą
Žieminiai rapsai	1,0–1,25	Po sėjos iki sudygimo BBCH (00-09)	Purškiama rudenį 1 kartą

## ŽIRNIAI, PUPOS IR SOJOS

### **CONAXIS 1,4 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00–09)**

**Labai geras veikimas:** trikertės žvaginės, vaistinės ramunės, bekvapiai šunramuniai.

**Geras veikimas:** paprastosios rietmenės, kibiejai lipikai, raudonžiedės notrelės, daržinės žliūgės, smulkieji snapučiai.

**Vidutiniškai geras veikimas:** peliniai pašiaušėliai, baltosios balandos, dėmėtieji rūgčiai, paprastosios žilės, dirvinės čiuzutės.

**Silpnas veikimas:** dirviniai vijokliai, nelygialapiai rūgčiai, vijokliniai pelėvirkščiai, garstukai, dirvinės našlaitės.

### **CONAXIS 1,0 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00–09)**

**Labai geras veikimas:** vaistinės ramunės.

**Geras veikimas:** trikertės žvaginės, raudonžiedės notrelės, daržinės žliūgės.

**Vidutiniškai geras veikimas:** peliniai pašiaušėliai, paprastosios rietmenės, smulkieji snapučiai, kibiejai lipikai.

**Silpnas veikimas:** baltosios balandos, dirviniai vijokliai, bekvapiai šunramuniai, dėmėtieji rūgčiai, paprastosios žilės, dirvinės čiuzutės, dirvinės našlaitės.

## VASARINIAI RAPSAI

### **CONAXIS 1,25 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00–09)**

**Labai geras veikimas:** daržinės žliūgės.

**Geras veikimas:** dirvinės čiuzutės.

**Vidutiniškai geras veikimas:** paprastosios rietmenės, kibieji lipikai, smulkieji snapučiai, persinės veronikos.

**Silpnas veikimas:** šiurkštieji burnočiai, baltosios balandos, vijokliniai pelėvirkščiai, dirvinės našlaitės.

## **ŽIEMINIAI RAPSAI**

### **CONAXIS 1,25 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09)**

**Labai geras veikimas:** trikertės žvaginės, apskritalapiai snapučiai, vaistinės ramunės, vienametės miglės, daržinės žliūgės, pūdyminės veronikos, gebenlapės veronikos, persinės veronikos.

**Geras veikimas:** dirviniai bobramuniai, kibieji lipikai, karpytieji snapučiai, smulkieji snapučiai, raudonžiedės notrelės, bekvapiai šunramuniai, paprastosios žilės, baltosios garstyčios, dirvinės čiuzutės.

**Vidutiniškai geras veikimas:** rugiagėlės, baltosios balandos, pūdyminės aguonos.

**Silpnas veikimas:** vaistinės žvirbliarūtės, dirvinės našlaitės.

### **CONAXIS 1,0 l/ha po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09)**

**Labai geras veikimas:** trikertės žvaginės, vaistinės ramunės, daržinės žliūgės, gebenlapės veronikos, persinės veronikos.

**Geras veikimas:** kibieji lipikai, smulkieji snapučiai.

**Vidutiniškai geras veikimas:** rugiagėlės, raudonžiedės notrelės, pūdyminės aguonos, dirvinės čiuzutės, pūdyminės veronikos.

**Silpnas veikimas:** baltosios balandos, vaistinės žvirbliarūtės, bekvapiai šunramuniai, dirvinės našlaitės.

## **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Po CONAXIS panaudojimo, esant nepalankiomis oro sąlygoms, gali pasitaikyti augalų streso simptomų (lengvas lapų pabalimas, deformavimasis, dalinis pasėlių praretėjimas, laikinas augimo sustabdymas). Šie simptomai paprastai išnyksta po kelių savaitių ir neturi neigiamos įtakos augalų derliui ir kokybei.

Nenaudokite CONAXIS, jei yra nors viena iš šių nepalankių sąlygų:

- Augalų sėklos jau pradėjo dygti (esant ypač palankioms sąlygoms, rapsų dygimas gali prasidėti praėjus 36 valandoms po sėjos).
- Sėklos nepadengtos 2 cm dirvos sluoksniu.
- Prognozuojamas smarkus lietus.
- Vėlyvos sėjos žieminiai rapsai.
- Dirvos su mažu humuso kiekiu.
- Durpiniai dirvožemiai.

## SĖJOMAINA

### ŽIEMINIAI RAPSAI

Po žieminių rapsų, purkštų CONAXIS, derliaus nuėmimo, kitais metais galima auginti visus augalus.

Kai CONAXIS jau buvo panaudotas, o augalai žūsta rudenį:

Atsėti **žieminius rapsais** galima praėjus 3 savaitėms po herbicido panaudojimo, po gilaus ir intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti **žieminius javais** (kviečiais, miežiais, rugiais, kvietrugiais, spelta kviečiais) galima praėjus 1,5 mėnesio po herbicido panaudojimo, po gilaus ir intensyvaus dirvos dirbimo, rekomenduojama sėklos normą padidinti 15 %.

Kitą pavasarį:

Atsėti **vasarinius javais** (kviečiais, miežiais, rugiais, kvietrugiais, spelta kviečiais) galima praėjus 5 mėnesiams po herbicido panaudojimo, po vidutiniškai intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti **vasarinius rapsais, ankštiniais augalais** galima praėjus 5 mėnesiams po herbicido panaudojimo, specialių reikalavimų dirvos dirbimui nėra.

Atsėti **cukriniais runkeliais, kukurūzais** galima praėjus 6 mėnesiams po herbicido panaudojimo, specialių reikalavimų dirvos dirbimui nėra.

Atsėti **vasarinėmis pašarinėmis žolėmis, dobilais ar liucerna** galima praėjus 6 mėnesiams po herbicido panaudojimo, po vidutiniškai intensyvaus dirvos dirbimo.

### VASARINIAI RAPSAI, VISŲ TIPŲ ŽIRNIAI, PUPOS IR SOJOS

Po CONAXIS panaudojimo laiku nuėmus derlių, po to galima auginti visus augalus.

Kai augalai žūva, o CONAXIS jau buvo panaudotas, tą patį pavasarį:

Atsėti **vasarinius rapsais** galima praėjus 3 savaitėms po herbicido panaudojimo, po gilaus ir intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti **vasarinius javais** (kviečiais, miežiais, rugiais, kvietrugiais, spelta kviečiais) galima praėjus 1,5 mėnesio po herbicido panaudojimo, po gilaus ir intensyvaus dirvos dirbimo, rekomenduojama sėklos normą padidinti 15 %.

Atsėti **kukurūzais** galima praėjus 1 mėnesiui po herbicido panaudojimo, po vidutiniškai intensyvaus dirvos dirbimo.

Atsėti **žirniais, pupomis ir sojomis** galima praėjus 1,5 mėnesio po herbicido panaudojimo, po vidutiniškai intensyvaus dirvos dirbimo.

Negalima atsėti **cukriniais runkeliais, pašarinėmis žolėmis, dobilais ar liucerna**.

### GRETA AUGANTYS AUGALAI

Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.

### VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha.

## PURKŠTUVO PLOVIMAS

Visada plaukite purkštuvą iškart po purškimo tą pačią dieną arba keičiant purškiamus produktus.

1. Pripildykite 1/3 vandens rezervuaro gėlu vandeniu. Išplaukite purkštuvą ir leiskite cirkuliuoti sistemoje. Plovimui naudojamą vandenį išpurškite ant tuo pačiu produktu apdoroto lauko. Plovimą pakartokite tris kartus. Vandens rezervuare turėtų būti ne mažiau kaip 10 % visos talpyklos. Purkštuvą galima visiškai ištuštinti ant biologiškai aktyvaus dirvožemio arba išleisti vandenį į specialią talpyklą.
2. Nuplaukite visą traktorių ir purkštuvo išorę, geriausia tame pačiame apdorotame lauke.
3. Laikykitės purškimo įrangos gamintojo purkštuvo plovimo instrukcijų. Įsitikinkite, kad vanduo išplovė visas purškimo įrangos dalis.
4. Purkštukus ir filtrus reikia nuimti ir išplauti atskirai, naudokite plovimui skirtas priemones, pvz.: Neutralize Tank Cleaner®.
5. Tuščia pakuotė ir purškimo įranga turi būti plaunami taip, kaip tą numato galiojantys teisės aktai.