



Candit®



Fungicidas

Lokaliai sisteminio veikimo fungicidas, skirtas naudoti obelyse ir kriaušėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, šilauogėse ir spanguolėse, braškėse, auginamose lauke ir šiltnamiuose, rožėse, auginamose lauke ir šiltnamiuose, chrizantemose ir kituose žydinčiuose dekoratyviniuose augaluose, auginamuose šiltnamiuose.

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Veiklioji medžiaga: | krezoksim-metilas 500 g/kg |
| Cheminė grupė: | strobilurinų |
| Produkto forma: | vandenyje dispersiškos granulės |
| Pakuotė: | 0,2 kg |

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinų grupės fungicidams. Krezoksim-metilo veikimas yra lokaliai sisteminis ir translaminarinis arba dalinai sisteminis. Dėl paviršiaus sisteminio veikimo ir labai gero atsparumo lietai Candit turi gerą ir ilgalaikį apsauginį poveikį nuo ligų.

Candit, naudojamas nuo rauplių soduose, turi apsauginį ir gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą. Serbentuose ir dekoratyviniuose augaluose Candit reikia purkšti profilaktiškai.

AUGALAI IR LIGOS

| Augalai | Ligos | Norma kg/ha | Naudojimas |
|---|---|-------------|--|
| Obelys ir kriaušės | Obelių ir kriaušių rauplės, miltligė* | 0,2 | Purškama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams, 2 kartus iš eilės 7–14 dienų intervalu, nuo pumpurų skleidimosi pradžios/žiedinių pumpurų sproginimo pradžios iki vaisių brandos pradžios/vaisių nusispalvinimo pradžios (BBCH 53–81). Purškite 2 kartus iš eilės 7–14 dienų intervalu, atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą. |
| Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos | | | |
| Raudonieji ir juodieji serbentai, šilauogės, spanguolės | Miltligė* | 0,2 | Purškama profilaktiškai nuo pumpurų skleidimosi pradžios/išbrinkus žydėjimo pumpurams iki pirmosios uogos ant skrotelės pagrindo įgyja veislei būdingą spalvą (BBCH 51–85). Purškite 2 kartus iš eilės 7–14 dienų intervalu, atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą. |
| Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų | | | |
| Braškės lauke ir šiltnamiuose | Miltligė* | 0,2 | Purškama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams nuo laikotarpio, kai išsiskleidžia pirmasis lapas iki antro derliaus vaisių nusispalvinimo būdinga spalva (BBCH 11–89). |
| Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos | | | |
| Rožės lauke | Rožių miltligė*, rožių rudoji dėmėtligė | 0,06-0,2 | Purškite ant ką tik išaugusių lapų, kai išsiskleidžia pirmasis lapas iki vaisių brandos pabaigos (BBCH 11–89). |
| Naudojimas mažuose plotuose** | | | |
| Rožės, chrizantemos, dekoratyviniai žydintys augalai šiltnamiuose | Rožių miltligė*, rožių rudoji dėmėtligė, chrizantemų rūdys, gvazdikų rūdys, begonijų miltligė*, pašaknio puviniai | 0,06-0,2 | Purškite ant ką tik išaugusių lapų, kai išsiskleidžia pirmasis lapas iki vaisių ir sėklų brandos pabaigos (BBCH 11–89). Purškite 2 kartus su 7–14 dienų intervalu. Jautresnėse veislėse ir stipriai plintant ligoms, Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veikimo būdą. |

Didžiausias purškimų skaičius visiems augalams – 2.

*Nuo miltligės purškite infekcijos pradžioje, kai miltligė pasirodo ant lapų ir ūglių. Laikas nuo vieno purškimo iki kito derinamas atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą.

Norėdami išvengti atsparumo, nenaudokite strobilurinių grupės fungicidų daugiau kaip 2 kartus iš eilės purškimo programoje. Jei atsparumas jau pasireiškė, Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veikimo būdą.

**Candit naudojimas mažais plotais auginamiems augalams išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

DĖMESIO!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams nuo 150 iki 1000 litrų vandens 1 hektarui. Šiltnamio augalams – 1000 litrų 1 hektarui. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštiesiems medžiams purkšti naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.

MAIŠYMAS

Candit galima maišyti su augimo reguliatoriumi Regalis Plus, fungicidais Effector, Delan Pro, Scala ir Signum.

TIRPALO PARUOŠIMAS

$\frac{1}{2}$ arba $\frac{3}{4}$ purkštuvo rezervuaro užpildykite švari vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Candit ir baikite pilti vandenį. Candit berkite lėtai, leiskite produktui gerai ištirpti. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Įsitikinkite, kad augalų lapų paviršius gerai padengtas tirpalu. Aukštesniems medžiams naudokite daugiau vandens. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purškite.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

