

Corbel[®]



Fungicidas

Sisteminis morfolinų grupės fungicidas, naudojamas nuo miltligės ir kitų javų ligų.

Veiklioji medžiaga:	fenpropimorfis 750 g/l
Produkto forma:	koncentruota emulsija
Pakuotė:	5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Corbel labai veiksmingas nuo miltligės, jis labai greitai sustabdo jau įvykusią infekciją. Taip pat jis gerai veikia nuo geltonųjų rūdžių, smulkiųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės. Galima naudoti javuose nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69).

Veiklioji medžiaga fenpropimorfis priklauso fungicidų grupei – morfolinams. Jis labai greitai patenka į augalą, turi labai gerą apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo miltligės, rinchosporiozės ir rūdžių, be to gerai veikia ir vėsiu oru, (nuo +6° C). Fenpropimorfis pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu nuo miltligės. Poveikis trunka 3–4 savaites, priklausomai nuo drėgmės, temperatūros ir augimo sąlygų.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Miltligė	0,5	Miltligės pasireiškimo pradžioje
	Geltonosios rūdys	0,5	Rūdžių pasireiškimo pradžioje
	Rudosios rūdys	0,5	Purkšti profilaktiškai
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	0,5	Miltligės pasireiškimo pradžioje
	Smulkiosios rūdys	0,5	Rūdžių pasireiškimo pradžioje
	Rinchosporiozė	0,5	Purkšti profilaktiškai
Rugiai	Miltligė	0,5	Miltligės pasireiškimo pradžioje
	Rudosios rūdys	0,5	Rūdžių pasireiškimo pradžioje
Avižos	Miltligė	0,5	Miltligės pasireiškimo pradžioje

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Didžiausias purškimų skaičius – 2.

MAIŠYMAS

Corbel gali būti maišomas su daugeliu javuose plačiai naudojamų herbicidų, augimo reguliatorių, fungicidų ar insekticidų: Arrat, Biathlon 4D, Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Terpal, Adexar, Brutus, Ceriax, Allegro Super, Bell Super, Duett Ultra, Opera N, Tango Super, Tango Flex, Tracker, Librax, Juventus 90, Flexity, Viverda, Fastac 50 ir kt.

Purškiant miežius, Corbel gali būti maišomas su azotinėmis trąšomis, turinčiomis amoniako. Didžiausia norma – 15 kg/ha azoto veiklios medžiagos. Nepurškite labai karštą ir saulėtą dieną. Purkšdami kviečius ir rugius, nemišykite Corbel su karbamiidu ar azotinėmis trąšomis, turinčiomis amoniako.

Vandens kiekis – 200–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1–2 val.

