



Kinto[®] Plus



Beicas

Sisteminio ir kontaktnio veikimo fungicidas skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.

| | |
|-----------------------|--|
| Veiklosios medžiagos: | fluksapiroksadas 33,3 g/l tritikonazolas 33,3 g/l fludijoksonilas 33,3 g/l |
| Cheminės grupės: | imidazolų, triazolų ir fenilpirolų |
| Pakuotė: | 10 l, 200 l |

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Kinto Plus – trijų veikliųjų medžiagų naujusias fungicidinis beicas, skirtas javų sėklų apdorojimui. Kinto Plus saugo javus nuo per sėklą ir per dirvą plintančių ligų sukėlėjų.

Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę. **Tritikonazolas** priklauso triazolų klasės fungicidams ir veikia suardydamas sterolių sintezę. Tai sisteminio veikimo fungicidas, greitai patenkantis per šaknis į daigą ir pernešamas į augimo kūgelį. **Fludijoksonilas** yra ilgo kontaktnio veikimo fungicidinė veiklioji medžiaga, dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų, bei į dygstančio daigo koleoptilę.

Kinto Plus tai naujas BASF sėklų apsaugos standartas, kuris pakelia sėklų apsaugą į naują lygį.

Kinto Plus turi naują ir unikalią produkto formą užtikrinančią ne tik puikią sėklų, bet ir kitų išaugusių augalo dalių apsaugą.

Visos trys veikliosios medžiagos papildoma viena kitą ir pagerina viena kitos veiksmingumą nuo daugelio su sėkla ir per dirvą plintančių ligų. Su Kinto Plus apsauga nuo ligų pernešama nuo sėklos į kitas augalo dalis. Kinto Plus skatina šaknų vystymąsi, o tai užtikrina didesnę šaknų masę ir ilgesnes šaknis.

Naujos produkto formos dėka su Kinto Plus daug tolygesnis sėklų spalvinimas, padengimas, geresnis sėklų byrėjimas bei mažesnis dulketumas, kas nulemia geresnį sėklos dygimą bei spartesnį augalo šaknų augimą.

Labai didelis Kinto Plus privalumas yra tai, kad jį galima naudoti visose grūdinese kultūrose. Kinto Plus apsaugo nuo ne mažiau kaip 8 su sėkla ir per dirvą plintančių ligų.

AUGALAI IR LIGOS

| Augalai | Ligos | Veiksmingumas |
|--|-------------------------|---------------|
| Žieminiai kviečiai | Kietosios kūlės | ● ● ● |
| | Dulkančiosios kūlės | ● ● ● |
| | Daigų pašaknio puviniai | ● ● ● |
| | Pavasarinis pelėsis | ● ● ● |
| | Daigų septoriozė | ● ● |
| Vasariniai kviečiai | Kietosios kūlės | ● ● ● |
| | Dulkančiosios kūlės | ● ● ● |
| | Daigų pašaknio puviniai | ● ● ● |
| | Daigų septoriozė | ● ● |
| Kvietrugiai (žieminiai ir vasariniai) | Kietosios kūlės | ● ● ● |
| | Dulkančiosios kūlės | ● ● ● |
| | Daigų pašaknio puviniai | ● ● ● |
| | Pavasarinis pelėsis | ● ● ● |
| | Daigų septoriozė | ● ● |
| Žieminiai rugiai | Stiebinės kūlės | ● ● ● |
| | Daigų pašaknio puviniai | ● ● ● |
| | Pavasarinis pelėsis | ● ● ● |
| Žieminiai miežiai | Dulkančiosios kūlės | ● ● ● |
| | Juostuotoji dryžligė | ● ● ● |

| Augalai | Ligos | Veiksmingumas |
|--------------------|----------------------------------|---------------|
| Vasariniai miežiai | Dulkančiosios kūlės | ● ● ● |
| | Tinkliškoji dryžligė | ● ● ● |
| | Juostuotoji dryžligė | ● ● ● |
| | Daigų pašaknio ir šaknų puviniai | ● ● ● |
| Avižos | Dulkančiosios kūlės | ● ● ● |
| | Avižų dryžligė | ● ● ● |

●●● – labai veiksmingas; ●● – veiksmingas

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, Spelta kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos.
Norma: 1,5 l/t sėklos.

Žieminiai ir vasariniai rugiai, kvietrugiai.
Norma: 1,2–1,5 l/t sėklos.

NAUDOJIMAS

- Prieš beicuodami patikrinkite sėklų daigumą. Sėklų normą paskaičiuokite atsižvelgdami į sėklų stambumą ir beicuojamų sėklų daigumą.
- Naudokite sureguliuotas beicavimo mašinas, norint užtikrinti gerą padengimo kokybę.
- Naudojant Kinto Plus, aplinkos temperatūra turėtų būti nežemesnė kaip +5°C.
- Beicuoti naudojant 4–10 l tirpalo kiekį.
- Gerai ir tolygiai padenkite beicu sėklos paviršių, taip užtikrinsite beicavimo veiksmingumą.
- Beicuojamų sėklų drėgnumas turi būti apie 12 %. Sėklos, kurios buvo džiovintos džiovyklose, turi smulkius pažeidimus, per kuriuos produktas gali būti pasisavintas į sėklą, tai gali sumažinti daigumą.
- Beicuojant grūdų drėgnumas neturi viršyti 16 %.
- Nebeicuokite skaldytų, sulipusių ar kitaip pažeistų grūdų.
- Po apdorojimo su Kinto Plus sėklos turi būti laikomos sausai.
- Beicuotos sėklos į sėjos vietą vežamos sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba maišuose su užrašu „beicuota“ ir nurodomas augalų apsaugos produkto pavadinimas.