

# Priaxor Power Pack

Priaxor® + Curbatur®<sup>3</sup> fungicidai

 **AgCelence**  
Tikėkitės daugiau

Priaxor Power Pack



FUNGICIDAI



Veikliosios medžiagos:

PRIAXOR fluksapiroksadas 75 g/l

piraklostrobinas 150 g/l

CURBATUR®<sup>3</sup> protiokonazololas 250 g/l



Produkto forma

koncentruota emulsija



Pakuotė

5 l PRIAXOR + 5 l CURBATUR®<sup>3</sup>



PRIAXOR POWER PACK pakuotė sudaryta iš dviejų fungicidų: PRIAXOR ir CURBATUR®<sup>3</sup>. Abu fungicidai naudojami mišinyje. Šis mišinys pasižymi apsauginiu ir gydomuoju veikimu, naudojamas nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ligų.

PRIAXOR POWER PACK pakuotė skirta 10–12 ha plotui nupurkšti.

Trijų veikliųjų medžiagų mišinys užtikrina labai platų veikimo spektrą.

## VEIKIMO BŪDAS

**PRIAXOR** pasižymi labai plačiu veikimo spektru prieš pagrindines javų ligas ir išskirtinai geru gydomuoju veikimu bei ilgalaikė apsauga.

PRIAXOR sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų – piraklostrobino ir fluksapiroksado. Abiejų veikliųjų medžiagų yra labai didelė koncentracija litre, todėl pilnoje normoje PRIAXOR yra beveik du fungicidai.

Veiklioji medžiaga **piraklostrobinas** yra apsauginis fungicidas, turintis ir gydomųjų savybių nuo rūdžių, kviečių dryžligės, tinkliškosios dryžligės ir rinchosporiozės. Jis yra lokaliai sisteminis ir translinarinis arba dalinai sisteminis. Piraklostrobino fiziologinis poveikis, kuris dar vadinamas *AgCelence* efektu, padeda augalui geriau įsisavinti dirvoje esantį azotą. Augalai, nupurkšti su piraklostrobinu, tampa atsparesni abiotiniam stresui, tokiam kaip sausra, kaitra ar saulės radiacija. Augalų lapai ilgiau išlieka žalesni, lėtėja senėjimo procesas, ir dėl to didėja derlius bei gerėja grūdų kokybė.

**Fluksapiroksadas** yra plataus spektro, apsauginį ir gydomąjį veikimą turintis fungicidas, labai efektyvus nuo lapų septoriozės, lapų ir varpų septoriozės, rūdžių, miežių dryžligių, rinchosporiozės, kviečių dryžligės, ramularijos, miltligės, stiebalūžės. Skirtingai nuo kitų SDHI cheminės grupės medžiagų, fluksapiroksadas yra sisteminis fungicidas, kuris patekęs į augalą juda akropetaliai (iš apačios į viršų), taip pat pernešamas į naujai išaugusius lapus.

PRIAXOR sumažina vandens garavimą iš augalo lapų. Pakankamos vandens atsargos itin svarbios grūdų užsipildymui bei geresniam derliui gauti.

Unikali produkto forma užtikrina labai gerą atsparumą lietuvi.

**CURBATUR<sup>®3</sup>** sudėtyje esanti veiklioji medžiaga **priotiokonazol** priklauso triazolo grupei. CURBATUR<sup>®3</sup> yra ilgo veikimo, sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju veikimu. Jis efektyviai naikina daugumą javų ligų sukėlėjų, ardydamas patogenų ergosterolių biosintezę. Jis efektyviai apsaugo nuo tokių javų ligų: kviečių dryžligės, stiebalūžės, lapų ir varpų septoriozės, tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės.

CURBATUR<sup>®3</sup> sustiprina fungicido PRIAXOR veikimą nuo stiebalūžės, kviečių dryžligės ir kitų ligų.

## AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma	Naudojimas
Vasariniai ir žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys stiebalūžė, miltligė, varpų fuzariozė.	Pakuotė 10–12 ha plotui arba PRIAXOR 0,4–0,5 l/ha CURBATUR <sup>®3</sup> 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Vasariniai ir žieminiai miežiai	Rinchosporiozė, dryžligės, smulkiosios rūdys, stiebalūžė, miltligė, ramularija, varpų fuzariozė.	Pakuotė 10–12 ha plotui arba PRIAXOR 0,4–0,5 l/ha CURBATUR <sup>®3</sup> 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).

Augalai	Ligos	Norma	Naudojimas
Vasariniai ir žieminiai kvietrugiai	Lapų septoriozė, lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, stiebalūžė, miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, varpų fuzariozė.	Pakuotė 10–12 ha plotui arba PRIAXOR 0,4–0,5 l/ha CURBATUR <sup>®3</sup> 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).
Rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, miltligė, stiebalūžė.	Pakuotė 10–12 ha plotui arba PRIAXOR 0,4–0,5 l/ha CURBATUR <sup>®3</sup> 0,4–0,5 l/ha	Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69).

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

## MAIŠYMAS

PRIAXOR ir CURBATUR<sup>®3</sup> galima maišyti su BASF augimo regulatoriais, insekticidais, BASF fungicidais, taip pat su kokybiškomis mikroelementinėmis trąšomis.

Vandens kiekis – 150–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.