



Fastac[®] 50



Insekticidas

Piretroidinis insekticidas naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse, pupose ir žirniuose, gūžiniuose, žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose. Špinatuose auginamuose sėkloms, Fastac registruotas pagal EP ir ET Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį.

Veiklioji medžiaga:	alfa-cipermetrinas 50 g/l
Produkto forma:	koncentruota emulsija
Pakuotė:	1 l, 5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Fastac 50 – labai veiksmingas, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas daugelio kenkėjų naikinimui žemės ūkio augaluose. Fastac 50 pasižymi kontaktiniu poveikiu, jis veikia taip pat per virškinimo organus. Insekticidas pasižymi ir repelentinėmis savybėmis, todėl juo nupurkšti augalai apsaugomi ilgą laikotarpį.

Fastac 50 pradėkite purkšti pasirodžius kenkėjams. Norint gauti optimalų poveikį, reikia gerai nupurkšti augalus. Naudojant didesnes normas, užtikrinama augalų apsauga ilgesniam laikotarpiui.

Fastac 50 veikia ilgai, nes jis gerai prikimba prie vaškinio sluoksnio, dengiančio lapų paviršių, todėl sunkiai nuplaunamas lietaus, atsparus šviesos poveikiui, gerai veikia esant šiltam orui. Fastac 50 registruotas profesionaliam naudojimui.

AUGALAI IR KENKĖJAI

Augalai	Kenkėjai	Norma l/ha	Naudojimas
Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, avižos	Amarai	0,25	Augalai purškiami vegetacijos laiku, kai pasirodo kenkėjai BBCH 10–71. Paskutinį kartą purškama 42 dienos iki derliaus nuėmimo.
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, rapsiniai žiedinukai, kryžmažiedžių spragės	0,20	Augalai purškiami vegetacijos laiku, kai pasirodo kenkėjai BBCH 10–59. Paskutinį kartą purškama 49 dienos iki derliaus nuėmimo.
Bulvės	Kolorado vabalai ir jų lervos	0,20	Augalai purškiami vegetacijos laiku, kai pasirodo kenkėjai (BBCH 10–59). Paskutinį kartą purškama 14 dienų iki derliaus nuėmimo.
Žirniai	Žirniniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai (sitonai)	0,20	Augalai purškiami vegetacijos laiku, kai pasirodo kenkėjai (BBCH 10–59). Paskutinį kartą purškama 7 dienos iki derliaus nuėmimo.
Pupos	Pupiniai amarai, gumbeliniai straubliukai (sitonai)	0,25	Augalai purškiami vegetacijos laiku, kai pasirodo kenkėjai (BBCH 10–59). Paskutinį kartą purškama 7 dienos iki derliaus nuėmimo.
Kopūstai gūžiniai, žiediniai, brokoliai	Spragės, baltukai, kandys, amarai	0,20	Kopūstai purškiami vegetacijos laiku, nuo skilčialapių pasirodymo iki pasiekus būdingą dydį (BBCH 10–49), kai pasirodo kenkėjai. Paskutinį kartą purškama 7 dienos iki derliaus nuėmimo.
Špinatai, auginami sėklai	Tripsai, spragės, maitvabaliai, amarai, rapsiniai žiedinukai	0,15	Augalai purškiami vegetacijos laiku, pradėjus plisti kenkėjams (BBCH 10–59.) Paskutinį kartą purškama 7 dienos iki derliaus nuėmimo.

Didžiausias purškimų skaičius – 2.

VANDENS KIEKIS

Norint pasiekti geriausią veikimą, reikia tolygiai ir visiškai apipurkšti augalus. Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha.

MAIŠYMAS

Fastac 50 gali būti maišomas su fungicidais, herbicidais, augimo regulatoriais bei skystomis trąšomis.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių.